

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**UNIRIO**

**Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – EEAP**

**Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PROPG**

**Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a  
Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos  
Moldes de Residência.**

**2018**

**PROVAS**

**OBJETIVA E DISCURSIVA**

PROVA OBJETIVA

1) Com relação às manifestações clínicas características da criança vítima de violência, será levantada suspeita na seguinte situação:

- a) existência de fratura em uma única região.
- b) ausência de episódios similares no passado.
- c) evidência de que as lesões não ocorreram em diferentes momentos.
- d) ausências de lesões novas durante a permanência da criança no hospital.
- e) ausência de sinais de negligência na saúde geral da criança.

2) O pré-escolar pode apresentar reações de ansiedade durante a hospitalização. Na fase denominada desespero, pode-se destacar que a criança

- I) torna-se apática, anorética inquieta, parece mal.
- II) pode chorar de maneira contínua ou intermitente.
- III) utiliza medidas de conforto (ex: chupa o dedo).
- IV) chora e sacode o berço com frequência.

Está **CORRETO** o que se afirma, apenas, em

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, III e IV.
- e) III e IV.

3) Enumere de 1 a 5 a sequência correta dos procedimentos relacionados à oxigenioterapia para crianças, considerando 1 para o primeiro e 5 para o último procedimento.

- ( ) Manter via aérea limpa através da aspiração.
- ( ) Explicar o procedimento para a criança e permitir que ela toque no equipamento.
- ( ) Observar a resposta da criança ao oxigênio.
- ( ) Providenciar fonte de umidificação.
- ( ) Mensurar frequência cardíaca e respiratória.

Assinale a sequência **CORRETA**:

- a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- b) 2 – 1 – 5 – 3 – 4
- c) 5 – 4 – 3 – 2 – 1
- d) 4 – 2 – 5 – 3 – 1
- e) 3 – 4 – 5 – 1 – 2

4) Uma criança de 6 anos está internada na enfermaria de pediatria e, após avaliação inicial, a enfermeira identifica alto risco para queda. Assim, inicia-se a adoção de condutas, destacando a orientação educativa ao escolar e à família, sobre tal risco e as ações preventivas para evitar a queda. Com base nos objetivos específicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a conduta da enfermeira tem como finalidade

- a) melhorar a gestão em saúde.
- b) promover a alta precoce da criança.
- c) envolver, apenas, o paciente nas ações de enfermagem.
- d) envolver o paciente e familiares nas ações de segurança do paciente.
- e) fomentar a inclusão do tema Segurança do Paciente no ensino técnico, graduação e pós-graduação na área da saúde.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**5)** HumanizaSUS é o documento base para gestores e para trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Com relação aos parâmetros para implementação de ações na atenção hospitalar, assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para as assertivas a seguir:

- ( ) Implantação de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho definido.
- ( ) Garantia de visita aberta, da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- ( ) Realização de atividades sistemáticas de formação e de educação permanente para crianças e para adolescentes.
- ( ) Implantação de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas às práticas hospitalares como as de cuidados domiciliares.
- ( ) Implantação de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso (pronto atendimento, pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapia).

A sequência **CORRETA** é:

- a) V V F V V
- b) V V V F V
- c) F F V V V
- d) V V V V V
- e) V F V F V

**6)** A Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014, em seu art. 11, redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. Leia o parágrafo a seguir para completá-lo.

Realizar a \_\_\_\_\_ à saúde das pessoas com \_\_\_\_\_, em todos os pontos de atenção, através da realização de ações e serviços de \_\_\_\_\_ da saúde, \_\_\_\_\_ de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, \_\_\_\_\_ de danos e manutenção da saúde.

A opção que melhor completa o parágrafo, de acordo com o objetivo da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas é

- a) atenção básica; doenças crônicas; proteção; prevenção; redução.
- b) atenção integral; doenças crônicas; promoção e proteção; prevenção; redução.
- c) atenção especializada; doenças crônicas; sistemas de apoio; redução; prevenção.
- d) atenção integral; doenças agudas; sistemas de apoio; prevenção; redução.
- e) regulação e governança, doenças crônicas; promoção; redução; prevenção.

**7)** Considerando a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), no âmbito do Sistema Único de Saúde e sua interface com a assistência pediátrica, é **CORRETO** afirmar que

- a) não há definição de que o protocolo clínico é o documento que normatiza um padrão de atendimento a determinada patologia ou condição clínica.
- b) plano terapêutico será elaborado de forma individual por cada profissional, somente, em situação de alta vulnerabilidade.
- c) os Serviços de Urgência e de Emergência implementem acolhimento e protocolo de classificação de risco.
- d) os usuários internados possuem direito a acompanhamento em horários pré-estabelecidos.
- e) o direito de crianças e de adolescentes de brincar não está assegurado.

**8)** De acordo com o Artigo 3º da Lei 8080 /1990, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e aos serviços essenciais são compreendidos como

- a) conceito de saúde.
- b) fatores de risco para a saúde.
- c) determinantes e condicionantes para a saúde.
- d) ações complementares para a saúde.
- e) ações de promoção da saúde.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**9)** A Lei Nº 7.498 de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Em seu Artigo 11, afirma que o Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe, privativamente,

- a) participar de sindicâncias nos hospitais.
- b) executar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- c) atuar conforme determina a Direção da Instituição de Saúde.
- d) executar ações de tratamento simples.
- e) impedir situações de risco.

**10)** O acolhimento àqueles que fazem uso abusivo de álcool e de outras drogas se baseia em fatores fundamentais como a questão do acolhimento e do território. Neste sentido, o Ministério da Saúde indica como local de atendimento

- a) Hospitais psiquiátricos especializados.
- b) Comunidades terapêuticas.
- c) Hospitais gerais.
- d) CAPS III.
- e) CAPS ad III.

**11)** Os serviços que constituem a Rede da Atenção Psicossocial, segundo a Portaria nº 3088, de dezembro de 2011, são

- a) Centro de Convivência, Consultório na Rua e Comunidade Terapêutica.
- b) SAMU 192, Serviços Residenciais Terapêuticos e Consultório na Rua.
- c) Serviço Residencial Terapêutico, Centros de Convivência e Clínicas Privadas especializadas.
- d) Comunidade Terapêutica, SAMU 192 e Clínicas Privadas especializadas.
- e) Consultório na Rua, Serviço Residencial Terapêutico e Comunidade Terapêutica.

**12)** Townsend (2011) considera os seguintes itens como fatores de risco aos clientes com comportamento suicida:

- a) Ser casado, ter entre 20 e 60 anos e ter histórico familiar de transtornos psiquiátricos.
- b) Ser solteiro, ter 20 e 60 anos e ser de classe média.
- c) Ser solteiro, ter mais de 65 anos e ter histórico familiar de transtornos psiquiátricos.
- d) Ser adolescente, ser casado e estar em estado de pobreza extrema.
- e) Ser casado, idoso e ser da classe média.

**13)** Segunda Townsend (2011), os elementos básicos para o desenvolvimento da relação terapêutica enfermeiro-cliente são:

- a) Simpatia, respeito e sintonia.
- b) Autoconhecimento, simpatia e respeito.
- c) Distanciamento emocional, estabelecimento de confiança e sintonia.
- d) Autoconhecimento, estabelecimento de confiança e empatia.
- e) Distanciamento emocional, simpatia e sintonia.

**14)** A esquizofrenia é uma síndrome psicótica caracterizada pelos seguintes sintomas:

- a) ruptura da relação eu-mundo, delírios e alucinações.
- b) comportamento bizarro, integridade do pensamento e alucinações.
- c) manutenção da relação eu-mundo, delírios e alucinações.
- d) risos imotivados, integridade do pensamento e alucinações.
- e) manutenção da relação eu-mundo, integridade do pensamento e eutimia.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**15)** Um enfermeiro precisa atender a uma prescrição de 4.500.000 UI de Penicilina G.Potássica. Temos na enfermaria frasco de Penicilina G.Potássica 5.000.000 UI, diluída em 8ml de água destilada. Considerando-se que o soluto da Penicilina equivale a 2ml da solução, ele deverá aspirar do frasco uma quantidade do medicamento igual a

- a) 4,5ml
- b) 5,5ml
- c) 6,3ml
- d) 8,0ml
- e) 9,0ml


**16)** Quando um paciente apresenta valores laboratoriais de sódio sérico igual a 160mEq/L e Potássio sérico igual a 2,5mEq/L, ele apresenta, respectivamente,

- a) Hipernatremia/Hipocalemia.
- b) Hipercalemia/Hipopotassemia.
- c) Hiperfosfatemia/Hipercalemia.
- d) Hiponatremia/Hipocalcemia.
- e) Hipocalcemia/Hipernatremia.

**17)** Foram prescritos 60mg de Garamicina intramuscular a um paciente com infecção urinária. Dispõe-se de ampolas de 2ml/80mg. Para atender à prescrição, o enfermeiro deverá aspirar da ampola de Garamicina a seguinte quantidade:

- a) 0,5 ml
- b) 1,0 ml
- c) 1,5 ml
- d) 1,6 ml
- e) 2,0 ml

**18)** A figura a seguir representa a monitorização cardíaca da seguinte derivação:



- a) D1
- b) D2
- c) D3
- d) AVL
- e) V2

**19)** Durante a ausculta respiratória de um paciente, a enfermeira observou presença de estertores nas bases pulmonares, frêmito tátil normal e ressonante a percussão. Esses achados históricos nos distúrbios respiratórios são comuns em clientes com quadro clínico de

- a) Edema Pulmonar.
- b) Pneumotórax.
- c) Atelectasia.
- d) Bronquite.
- e) Asma.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**20)** Foi admitido na enfermaria de Clínica Médica um paciente com quadro de hipoglicemia. Para reverter o quadro, foram prescritos 100ml de glicose a 50% a serem infundidos em meia hora. Para atender à prescrição, o enfermeiro deverá controlar o gotejamento da infusão a

- a) 33 mgts/min
- b) 50 mgts/min
- c) 60 mgts/min
- d) 100 mgts/min
- e) 200 mgts/min

**21)** Correlacione a **coluna 1** com a **coluna 2**

| Coluna 1      | Coluna 2                                       |
|---------------|--|
| 1.Hematêmese  | ( ) Prega do peritônio que circunda o estômago |
| 2.Piroze      | ( ) Ausência de ácido clorídrico no estômago   |
| 3.Melena      | ( ) Sangue nas fezes                           |
| 4.Omento      | ( ) Azia                                       |
| 5. Acloridria | ( ) Vômito com sangue                          |

A sequência **CORRETA** é

- a) 3-2-5-4-1
- b) 4-1-2-3-5
- c) 1-2-3-4-5
- d) 5-4-3-2-1
- e) 4-5-3-2-1

**22)** O sinal que avalia a presença de dor em clientes com suspeita de inflamação peritoneal denomina-se sinal de

- a) Piparote.
- b) Blumberg.
- c) Tinel.
- d) Murphy.
- e) Babinsky.

**23)** Nos casos de prolapso dos órgãos pélvicos, o tratamento cirúrgico ajuda a corrigir as anormalidades estruturais. Entretanto, nos estágios iniciais, os exercícios são mais efetivos, ao contrair e ao retesar os músculos vaginais. Esses exercícios são chamados de

- a) Hoffman.
- b) Kegel.
- c) Klapp.
- d) Williams.
- e) Clark.

**24)** São considerados fatores de risco para complicações cirúrgicas, **EXCETO**:

- a) Cefaleia
- b) Cirrose
- c) Hipertensão
- d) Função renal diminuída
- e) Extremos de peso

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**25)** Colangiografia Trans-hepática Percutânea pode ser realizada na presença de disfunção hepática e icterícia. Esse procedimento é útil para

- I) diferenciar a icterícia causada por doença hepática daquela causada por doença pancreática.
- II) investigar os sintomas GI de um paciente cuja a vesícula biliar foi removida.
- III) localizar cálculos dentro dos ductos biliares.
- IV) diagnosticar a presença de câncer envolvendo o sistema biliar.

A(s) afirmativa(s) **CORRETA(S)** é(ão), apenas,

- a) II, III e IV.
- b) II e IV.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I e III.

**26)** O Shunt Portossistêmico Intra-Hepático Transjugular (TIPS) é um método usado para reduzir a hipertensão portal e constitui o tratamento de escolha para

- a) Icterícia obstrutiva.
- b) Cirrose hepática.
- c) Hepatite Tóxica.
- d) Varizes esofágicas.
- e) Ascite refratária.

**27)** A cirurgia renal exige várias posições do paciente para expor adequadamente o local cirúrgico. As condutas para incisão cirúrgica são mais comuns nas abordagens

- a) Lombar, Toracoabdominal e Flanco.
- b) Lombar e Dorsal.
- c) Dorsal e Toracoabdominal.
- d) Ilíaca e Flanco.
- e) Ilíaca e lombar.

**28)** Nos casos de osteomielite, indica-se o desbridamento cirúrgico se a infecção for crônica e não responder à antibioticoterapia. Esse procedimento enfraquece o osso e como medida preventiva usa-se a fixação interna ou dispositivos de suporte externo para evitar fraturas

- a) traumáticas.
- b) compressivas.
- c) em forma de cunha.
- d) vintooobraznye.
- e) patológicas.

**29)** A abstinência de álcool é considerada como uma das possíveis causas de delírio pós-operatório. No caso da síndrome de abstinência aguda ou grave, poderá ser administrado

- a) Dormonid.
- b) Epinefrina.
- c) Fenobarbital.
- d) Haloperidol.
- e) Prometazina.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**30)** A Política Nacional para a Prevenção e o Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta como Princípios e Diretrizes Relacionados ao Cuidado Integral

- a) o atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de cuidado em um centro de referência que atenda a todos os níveis de atenção e de evolução da doença.
- b) o tratamento dos casos raros ou muito raros que exijam alto nível de especialização e maior porte tecnológico devem ser direcionados aos centros de pesquisa em saúde para aumento das chances de cura.
- c) a prevenção da iniciação do tabagismo e do uso do álcool e do consumo de alimentos não saudáveis como estratégias de rastreamento em grupos vulneráveis como adolescentes e idosos.
- d) a prevenção, a detecção precoce, o diagnóstico, o tratamento e os cuidados paliativos, oferecidos de forma oportuna, permitindo a continuidade do cuidado.
- e) a identificação, por parte dos diferentes profissionais, de sinais e de sintomas suspeitos dos tipos de cânceres passíveis de aconselhamento genético.

**31)** Diarreia, muco, pus e sangramento retal são sintomas referidos na doença intestinal inflamatória crônica. O Manejo de Enfermagem ao cliente portador dessa condição crônica inclui o uso de fármacos do

- a) Antibióticos.
- b) Anti-histamínicos.
- c) Aminossalicilatos.
- d) Imunoglobulinas.
- e) Iodeto de potássio.

**32)** A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma das doenças mais comuns em homens idosos. Ao exame físico, o enfermeiro avalia a presença de um sintoma obstrutivo e irritativo caracterizado por

- a) Disfunção sexual.
- b) Desconforto retal.
- c) Incrustação.
- d) Hematúria.
- e) Gotejamento.

**33)** A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) causa uma limitação progressiva do fluxo de ar e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões que gera

- a) hipoinflação pulmonar crônica.
- b) ganho de elasticidade pulmonar.
- c) vasodilatação da parede vascular pulmonar.
- d) aumento da ingestão alimentar e ganho de peso.
- e) desequilíbrio das proteinases e antiproteinases.

**34)** A adesão rigorosa aos princípios da assepsia pela equipe da Sala de Operação é de fundamental importância para a prevenção de infecção no sítio operatório. Em relação a esses princípios é **INCORRETO** afirmar que

- a) todos os materiais que entram em contato com a ferida cirúrgica ou são usados dentro do campo cirúrgico não necessitam estar esterilizados.
- b) a limpeza e a antisepsia da pele no sítio operatório contribuem para a redução do risco de infecção.
- c) os artigos estéreis empregados no ato cirúrgico devem ser manipulados em campo estéril sob técnica asséptica.
- d) uma ampla área da pele do paciente que será exposta durante o ato cirúrgico deve ser meticulosamente limpa e deve receber solução antisséptica.
- e) os equipamentos utilizados no ambiente cirúrgico devem ser conferidos e testados antes do uso no procedimento cirúrgico.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**35)** A Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e traz objetivos específicos e conceitos fundamentais, tais como:

- I) Segurança do Paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
- II) Dano: comprometimento da estrutura ou da função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- III) Incidente: evento ou circunstância que resultou em dano desnecessário ao paciente.
- IV) Evento adverso: incidente que pode resultar em dano ao paciente.
- V) Gestão de risco: aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e no controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.

As afirmativas **CORRETAS** são

- a) I, II e V.
- b) II, III e V.
- c) I, II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

**36)** Quanto à ausculta cardíaca é **CORRETO** afirmar que

- a) as bulhas B1 e B2 ocorrem devido ao fluxo de sangue na abertura das valvas cardíacas.
- b) a segunda bulha (B2) ocorre devido ao fechamento das valvas tricúspide e mitral.
- c) o intervalo de tempo entre as bulhas B1 e B2 corresponde à diástole.
- d) o atrito é auscultado na sístole ou diástole em casos de pericardite.
- e) o galope ou o estalido são sons patológicos que ocorrem em doenças atriais.

**37)** Entre as manifestações clínicas referentes ao Acidente Vascular Encefálico, pode-se encontrar

- a) apraxia como incapacidade de executar uma atividade aprendida anteriormente.
- b) hemiparesia como paralisia de um dos lados do corpo causada pela lesão no lado oposto do cérebro.
- c) hemianopsia homônima como perda total do campo visual e diplopia como visão dupla.
- d) afasia receptiva como incapacidade de formar palavras que sejam compreensíveis.
- e) parestesias como fraqueza da face, do braço e da perna no mesmo lado devido lesão a lado oposto do cérebro.

**38)** Durante a consulta de enfermagem, o cliente relata para o enfermeiro que “anda mais lentamente no plano porque tem menos fôlego que outras pessoas”: A enfermeira, ao classificar a dispneia, atribui ao cliente

- a) GRAU 0.
- b) GRAU 1.
- c) GRAU 2.
- d) GRAU 3.
- e) GRAU 4.

**39)** Numa situação clínica onde o paciente requer atenção imediata, o distúrbio pode ter risco de vida e não se pode adiar a indicação de cirurgia. A categoria cirúrgica é classificada como

- a) urgência.
- b) necessária.
- c) emergência.
- d) eletiva.
- e) opcional.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**40)** São exemplos de medicamentos com potencial para afetar a experiência cirúrgica

- a) Insulina e cefoxitina.
- b) Varfarina, eritromicina e solução de ringer com lactato.
- c) Diazepam, Clorpromazina e Prednisona.
- d) Clorpromazina e Solução Fisiológica a 0,9%.
- e) Hidroclorotiazida e cefazolina.

**41)** As instruções pré-operatórias que evitam complicações pós-operatórias são as seguintes:

- a) Não repetir exercícios de estimulação da respiração diafragmática.
- b) Evitar a respiração diafragmática e a tosse enquanto em decúbito lateral.
- c) Com a boca fechada, estimular a inspiração plenamente como um dos passos para a tosse.
- d) Posicionar as mãos com os punhos do paciente relaxados, permitir que as mãos repousem ligeiramente sobre a região frontal das costelas inferiores como um dos passos para facilitar a respiração diafragmática.
- e) Deitar o paciente em posição litotômica para realizar exercícios com as pernas, melhorando a circulação.

**42)** São exemplos de estratégias cognitivas para o enfrentamento do período perioperatório, **EXCETO**

- a) imagem orientada.
- b) distração.
- c) negação.
- d) auto-recitação otimista.
- e) estímulo de paciente para concentração em uma experiência agradável.

**43)** Os analgésicos opioides intravenosos comumente utilizados no período intraoperatório são:

- a) Morfina, fentanil, atracúrio
- b) Succinilcolina, cetamina, metocurina
- c) Pancurônio, morfina, vecurônio
- d) Sufentanil, Fentanil, alfentanil
- e) AAS, remifentanil, alfentanil

**44)** Os perigos da cirurgia para os pacientes idosos são proporcionais à gravidade dos problemas de saúde coexistentes e à natureza e duração do procedimento cirúrgico. Os princípios básicos que norteiam o planejamento da assistência ao idoso no período pós-operatório são os seguintes:

- a) A artrite é comum no paciente idoso, por isso, não constitui problema para a deambulação.
- b) O idoso deve ser estimulado a permanecer em repouso e restrito ao leito.
- c) As complicações respiratórias e cardíacas são causas incomuns de morbidade e de mortalidade nessa população.
- d) A redução do tecido gorduroso subcutâneo nos idosos protege-os de alterações de temperatura.
- e) As limitações sensoriais, como o comprometimento da visão, da audição e da sensibilidade tátil são razões de quedas.

**45)** Para que o ato cirúrgico seja realizado com segurança, o paciente deverá receber algum tipo de anestesia ou sedação. Em relação ao tipo de anestesia é **CORRETO** afirmar que

- a) a anestesia geral pode ser administrada por via intravenosa ou intramuscular.
- b) os pacientes que recebem anestesia regional permanecem conscientes durante todo o ato operatório.
- c) a anestesia peridural ou epidural é realizada através da injeção do anestésico diretamente no líquido.
- d) a anestesia espinal ou raquidiana é obtida através da injeção do anestésico no espaço epidural.
- e) os pacientes que recebem anestesia geral mantêm a função respiratória durante todo o ato operatório.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**46)** O “Pacto 2006” é um documento elaborado pelas três esferas governamentais que traz as diretrizes operacionais para os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Dentre as metas para o Controle do Câncer do Colo do Útero estão a cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero e

- a) a introdução da vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos de idade.
- b) a introdução da vacina contra o HPV para meninos acima de 15 anos de idade.
- c) o estímulo ao uso do preservativo em toda relação sexual.
- d) o incentivo para a realização da cirurgia de alta frequência.
- e) o estímulo ao uso do preservativo em relações sexuais de risco.

**47)** A apendicite é a causa mais comum de inflamação aguda no quadrante inferior direito da cavidade abdominal e de cirurgia abdominal de emergência. Embora possa ocorrer em qualquer idade, é mais frequente entre pessoas de 10 e 30 anos. Em relação às complicações da Apendicectomia, pode-se afirmar que

- a) a estenose ductal é uma das principais complicações da apendicectomia.
- b) a Apendicectomia é um procedimento cirúrgico simples, livre de complicações.
- c) a dor é a principal complicação, devendo ser monitorizada no pré e pós-operatório.
- d) as complicações mais comuns da apendicectomia incluem hipoacusia e arritmias cardíacas.
- e) a principal complicação da apendicectomia consiste em perfuração do apêndice, que pode levar à peritonite e à sepse.

**48)** A 14ª Conferência Nacional de Saúde ocorrida entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro de 2011, sob o tema “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pública e Patrimônio do Povo Brasileiro” apresentou em seu relatório final quinze diretrizes, dentre essas, a oitava teve como tema: AMPLIAR E FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA): TODAS AS FAMÍLIAS, TODAS AS PESSOAS, DEVEM TER ASSEGURADO O DIREITO A UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Analise as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) Fortalecer a Atenção Primária à Saúde como eixo organizador e estruturador do Sistema Único de Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção integral à saúde, garantindo todas as condições estruturais e financeiras para seu pleno exercício.
- ( ) Fortalecer o controle social e a participação popular nas Unidades Básicas de Saúde, incluindo os usuários e a sociedade civil organizada nas decisões sobre a dinâmica dos serviços, construção/reforma de unidades, áreas de cobertura etc., garantindo o acesso às informações necessárias.
- ( ) Reduzir o número máximo de usuários por equipe de Saúde da Família para 2.500, revendo a Portaria nº 648/2006.
- ( ) Modificar o critério do número de pessoas acompanhadas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), de forma que o número máximo seja de 400 pessoas na zona rural e de 600 pessoas na zona urbana.

A sequência **CORRETA** é

- a) V, F, F, F.
- b) V, V, F, F.
- c) V, V, V, V.
- d) V, F, V, F.
- e) F, V, F, V.

**Processo Seletivo Discente - Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização sob a Forma de Treinamento em Serviço para Enfermeiros nos Moldes de Residência.**

**49)** A Política Nacional de Humanização do SUS relata que humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre

- a) os trabalhadores e os gestores dos serviços de saúde.
- b) os trabalhadores, os usuários e os gestores dos serviços de saúde.
- c) os trabalhadores e os gestores locais dos serviços de saúde.
- d) os gestores das três esferas de saúde.
- e) a equipe de saúde e os usuários.

**50)** A Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/02 - resulta do contínuo movimento de pactuação entre os três níveis de gestão, visando ao aprimoramento do Sistema Único de Saúde por meio do fortalecimento de estratégias para concretização dos princípios e das diretrizes do SUS. Essa norma enfatiza a

- a) descentralização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- b) regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- c) regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior resolutividade.
- d) hierarquização como estratégia de complementação dos serviços de saúde e de busca de maior resolutividade.
- e) descentralização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior resolutividade.

**PROVA DISCURSIVA**

**1)** Considerando as complicações que podem decorrer de uma cirurgia,

- a) descrever os sinais clássicos do choque hipovolêmico.
- b) relatar 05 (cinco) fatores de risco para infecção na ferida.
- c) apresentar 05 (cinco) causas de Delírio Pós-operatório.

**2)** A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) compreende a forma como o trabalho da enfermagem é organizado, de acordo com o método científico, de modo que seja possível o melhor atendimento das necessidades de cuidado do indivíduo, da família e da comunidade. Considerando o domínio Promoção da Saúde e Sexualidade da Taxonomia NANDA - North American Nursing Diagnosis Association,

- a) indique cinco (05) diagnósticos de enfermagem relacionados aos fatores de risco implícitos nas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
- b) apresente cinco (05) intervenções de enfermagem relacionadas aos fatores de risco implícitos nas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).