

13ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

M E D I C I N A

DETECÇÃO DE TRANSTORNO BIPOLAR EM PACIENTES PORTADORES DE HIV COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO MAIOR INTERNADOS EM ENFERMARIA DE CLÍNICA MÉDICA

¹ Rafael Teixeira Morse (IC-UNIRIO); ² José Ramón Rodríguez Arras López (Orientador); ² Roberta Benitez Freitas Passos (Professora Auxiliar Dsc), ² Wagner Martignoni de Figueiredo (Professor Associado), ² Julio Cesar Tolentino Junior (Professor Assistente Ms); ¹ Jorge Henrique Narciso (IC-UNIRIO); ¹ Rodrigo Moura Elarrat (IC-UNIRIO).

1- Bolsista de Iniciação Científica, modalidade IC/UNIRIO.

2- Clínica Médica IV; Departamento de Medicina Gera (DEMEG); Escola de Medicina e Cirurgia (EMC); Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Apoio financeiro: Não.

Palavras-chave: depressão; transtorno bipolar; HIV.

INTRODUÇÃO

O transtorno bipolar (TB) caracteriza-se por um distúrbio do humor cursando com alternância de episódios de mania ou hipomania e depressão. Embora comum, é frequentemente subdiagnosticado nos pacientes que preenchem critérios diagnósticos de episódio depressivo maior (EDM). Os transtornos do humor são comuns nos pacientes portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), população na qual a depressão, além de frequente, é também subdiagnosticada, com efeitos deletérios na evolução da infecção. Episódios de mania podem ocorrer em decorrência da infecção pelo HIV (mania secundária)⁴, enquanto a mania do TB pode aumentar o risco da infecção pelo HIV. É fundamental a investigação deste diagnóstico psiquiátrico, pois com o tratamento farmacológico pode-se minimizar o risco de transmissão da infecção, melhorar a qualidade de vida desses pacientes e propiciar maior adesão ao tratamento antirretroviral.

OBJETIVO

Avaliar a presença de depressão bipolar em pacientes portadores de HIV com diagnóstico de episódio depressivo maior (EDM), internados em enfermaria de Clínica Médica.

METODOLOGIA

Estudo observacional, transversal. Foram incluídos 102 pacientes com sorologia positiva para o HIV, de junho de 2011 a abril de 2014. Aplicação do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) para diagnóstico de EDM e Questionário de Transtorno do Humor ou Mood Disorder Questionnaire (MDQ) para o reconhecimento de mania/ hipomania prévia.

RESULTADOS

Dos 102 pacientes HIV positivos, 47 (46,07%) preencheram critérios diagnósticos para EDM e 25 destes pacientes com depressão (53,19%) apresentaram indícios de mania ou hipomania prévia.

CONCLUSÃO

Indícios de transtorno bipolar foram detectados em 53,19% dos pacientes HIV positivos internados em enfermaria de Clínica Médica com diagnóstico de episódio depressivo maior. De acordo com este trabalho, a investigação de transtorno bipolar deve ser feita em todos os pacientes soropositivos com depressão.

REFERÊNCIAS

1. GUPTA, R. ; DANDU, M. ; PACKEL, L. ; RUTHERFORD, G. ; LEITER, K. ; PHALADZE, N. ; KORTE, F. P.; LACOPINO, V.; WEISER, S. D. Depression and HIV in Botswana: A Population-Based Study on Gender-Specific Socioeconomic and Behavioral Correlates. PLoS ONE, 2010; Dez. (5): p. 1-9
2. BEYER, J. ; KUCHIBHATLA, M. ; GERSING, K.; KRISHNAN, K. R. R. Medical Comorbidity in a Bipolar Outpatient Clinical Population. Neuropsychopharmacology, 2005; (30): p. 401-404
3. Depression and HIV/AIDS. [Base de dados na internet]: National Institute of Mental Health. [Acesso em 2012 set. 27] Disponível em <http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression/index.html>



13ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

4. NAKIMULI-MPUNGU, E.; MUSISI, S.; KATABIRA, E.; NACHEGA, J.; BASS, J. Prevalence and factors associated with depressive disorders in an HIV + rural patient population in southern Uganda. *Jornal off Affective Disorders*, 2011; Ago. (135): p. 160-167
5. CRUESS, D. G.; EVANS, D.L.; REPETTO, M.J.; GETTES, D.; DOUGLAS, S.D.; PETITTO, J. M. Prevalence, Diagnosis, and Phamacological Treatment of Mood Disorders in HIV Disease. *Society of Biological Psychiatry*, 2003; (54): p. 307-316
6. PERETTA, P.; AKISKAL, H. S.; NISITA, C.; LORENZETTI, C.; ZACCAGNINI, E.; DELLA SANTA, M.; CASSANO, G. B. The high prevalence of bipolar II and associated cyclothymic and hiperthymic temperaments in HIV-patients. *Jornal off Affective Disorders*, 1998; (50): p. 215-22