



# ALBERTO A

Estrada da Vista Chinesa 741  
Alto da Boa Vista  
20531-410 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

ISSN 0103-4944

Vol. 4

15 de março de 1996

Nº 7

## ÍNDICE DAS ESPÉCIES DE MORÁCEAS DO BRASIL

### Jorge Pedro Pereira Carauta

FEEMA, Serviço de Ecologia Aplicada  
Estr. Vista Chinesa 741, Alto da Boa Vista  
20.531-410 - Rio de Janeiro, RJ

### Sergio Romaniuc Neto

Instituto de Botânica  
Caixa Postal 4005  
01061-970 - São Paulo, SP

### Claude Sastre

Muséum National d'Histoire Naturelle  
Laboratoire de Phanérogamie  
16 Rue Buffon  
75005, Paris, France

**RESUMO.** Lista das espécies de Moraceae (*sensu lato*) do Brasil, segundo Engler, pertencentes aos gêneros *Bagassa*, *Batocarpus*, *Brosimum*, *Castilla*, *Cecropia*, *Clarisia*, *Coussapoa*, *Dorstenia*, *Ficus*, *Helianthostylis*, *Helicostylis*, *Maclura*, *Maquira*, *Naucleopsis*, *Perebea*, *Pourouma*, *Pseudolmedia*, *Sorocea*, e *Trymatococcus*. As espécies são seguidas pelo autor, obra, nome vulgar, tipo, categoria da UICN, distribuição geográfica no Brasil e algumas observações.

**Palavras-chave:** Moraceae, Brasil, Taxonomia e Fitogeografia.

**ABSTRACT.** Index of the Brazilian Moraceae species. Listing of the Brazilian species in the Moraceae (*sensu lato*) belonging to the genera *Bagassa*, *Batocarpus*, *Brosimum*, *Castilla*, *Cecropia*, *Clarisia*, *Coussapoa*, *Dorstenia*, *Ficus*, *Helianthostylis*, *Helicostylis*, *Maclura*, *Maquira*, *Naucleopsis*, *Perebea*, *Pourouma*, *Pseudolmedia*, *Sorocea*, and *Trymatococcus*. For each species the following are given: author, place of publication, common name, type, UICN category, geographic distribution and observations.

**Key-words:** Moraceae, Brazil, Taxonomy and Phytogeography.

(Versão: Joseph H. Kirkbride, Jr.)

RÉSUMÉ. Liste des espèces brésiliennes de Moracées s.l. selon Engler qui constituent la plus importante famille de l'ordre des Urticales avec pour le Brésil, les genres suivants (par l'ordre alphabétique): *Bagassa*, *Batocarpus*, *Brosimum*, *Castilla*, *Cecropia*, *Clarisia*, *Coussapoa*, *Dorstenia*, *Ficus*, *Helianthostylis*, *Helicostylis*, *Maclura*, *Maquira*, *Naucleopsis*, *Perebea*, *Pourouma*, *Pseudolmedia*, *Sorocea*, et *Trymatococcus*. Les espèces d'un même genre sont listées par ordre alphabétique. Chaque nom spécifique est suivi par le (ou les) noms d'auteur, la référence de la première publication du binôme actuellement valide, du nom vernaculaire, de la citation du matériel type, de la catégorie de l'UICN, de la distribution géographique au Brésil et de quelques remarques.

Mots-clés: Moracées, Brésil, Taxonomie et Phytogéographie.

### INTRODUÇÃO

Moraceae é a maior das famílias da Ordem Urticales e ainda não se acha perfeitamente conhecida sob o ponto de vista taxonômico. Todavia aumentam o número de trabalhos, particularmente de botânica econômica, que muitas vezes trazem incorreções na nomenclatura das espécies. A população de nosso país aumenta e diminuem as áreas verdes, deixando muitas espécies desta família ameaçadas de extinção. Para facilitar os trabalhos de pesquisas em Moráceas, tanto taxonômicas quanto de botânica econômica, é que elaboramos este índice.

### MATERIAL E MÉTODOS

Foram pesquisadas as espécies brasileiras de Moraceae, consideradas num sentido amplo, incluindo Cecropiaceae, de acordo com o sistema de classificação de Engler (*in* Engler & Prantl, Pflanzenfamilien 3(1): 59-118, 1889). Houve consulta aos principais herbários do Brasil e do exterior, assim como à literatura sobre a família em nosso país, referida no texto na forma abreviada.

As espécies são citadas logo abaixo dos gêneros, sem a repetição do nome genérico, seguidas do(s) autor(es) da espécie, primeira publicação do binômio atualmente válida, nome vulgar, tipo (T), categoria (Cat.) segundo IUCN red list categories, 1994 e consulta à chave existente em Albertoa 4(6): 67, 1996, finalmente a ocorrência na região do Brasil ou Estados: Região Norte - AC, AP, PA, RO e RR; Região Nordeste - AL, CE, MA, PB, PE, PI, RN e SE; Região Sudeste - BA, ES, MG, RS e SP; Região Sul - PR, SC e RS; Região Centro-Oeste - DF, GO, MS, MT e TO.

Esta lista de espécies não aborda subespécies, variedades e formas.

### RESULTADOS

**MORACEAE** Link, Handb. 2: 444. 1831 (*Moriformes*); Lindl., Veg. Kindg.: 266. 1847.

*Nom. cons.*

#### *Bagassa* Aublet

*B. guianensis* Aublet, Pl. Gui. Suppl. 15, t. 376, 1775. JAVAIDAM. T.: Guiana Francesa; Aublet (BM). Cat.: vulnerável (VU) B2c3d. PA.

*B. tiliifolia* (Hamilton) Benoist, Arch. Bot. Caen. 5 (Mém. 1): 31, 1933. JAVAIDAM. LT: Gaudichaud, Voy Bonite t. 88, 1844. Cat.: vulnerável (VU) B2c3d. PA.

#### *Batocarpus* H. Karsten

*B. amazonicus* Ducke, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 39-40, 1939. ÁRVORE-DE-LEITE. T.: PA, arredores de Óbidos, Cacaual Imperial; Ducke (MG, Isotipo: RB. MG, US, F e S). Cat.: não avaliado (NE). PA e AM.

*B. maranhensis* Mello Filho & Emmerich, Bol. Mus. Nacional 37: 9, 1968. MURURÉ. T.: MA, Viana; Ózimo de Carvalho 1 (R). Cat.: em perigo (EN) B1,C2b. MA. Obs.: Espécie com apenas uma coleta.

***Brosimum* Swartz**

*B. acutifolium* Huber, Bol. Mus. Goeldi 6: 66, 1910. MURURÉ. T.: PA, Peixe Boi, Estrada de ferro Bragança; Goeldi (MG, Isotipo: F e RB). Cat.: não avaliado (NE). Região amazônica e Guianas.

*B. alicastrum* Swartz, Prodr. Veg. Ind. Occ. 12, 1788. TILO. T.: Jamaica; Swartz (S, TILO). Cat.: não avaliado (NE). AM ao México.

*B. amplicomma* Ducke, Tropical Woods 31: 10, 1932. CAUCHO-MACHO. T.: AM, a leste de Manaus; Ducke 68 (F, Isotipo: NY). Cat.: não avaliado (NE). AM. Obs.: Cf. *B. parinarioides* Ducke, fide Berg, in *Flora Neotropica* 7: 206, 1972.

*B. gaudichaudii* Trécul, Ann. Sc. Nat. 3(8): 139, t.6, fig. 172-181, 1847. APÉ, MURURERANA. LT.: PI, perto do Rio Gurgueia; Gardner 2726 (P). Cat.: não avaliado (NE). Obs.: Comum em todas as regiões do Brasil, principalmente em áreas de cerrado, é rara, porém, no Estado do Rio de Janeiro.

*B. glaucum* Taubert, Bot. Jahrb. 12 (Beibl. 27): 4, 1890. LEITEIRO. T.: MG, Caraça, perto de Ouro Preto, (B, Isotipo: K e LE). Cat.: em perigo (EN) B1, 3b, D1. MG.

*B. glazioui* Taubert, Bot. Jahrb. 12 (Beibl. 27): 3, 1890. ("Glaziouvii"). MARMELINHO. LT.: RJ, entre Palmeira e Macaco; Glaziou 13496 (B, F). Cat.: em perigo (EN) B2bc. Sudeste e Sul.

*B. guianense* (Aublet) Huber, Bol. Mus. Goeldi 5: 337, 1909. AITÁ, MUIRAPINIMA-VERDADEIRA. T.: Guiana Francesa; Aublet s/n (BM). Cat.: vulnerável (VU) A1a, C. Norte, Nordeste e Sudeste.

*B. lactescens* (Sp. Moore) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 19(3): 226, 1970. MANICHI, LEITEIRO. LT.: MT, Santa Cruz; Sp. Moore 677 (BM). Cat.: próxima a ameaçado (LR, nt). Do Sul do Brasil ao México.

*B. longifolium* Ducke, Arq. Serv. Flor. Rio de Janeiro 1: 3, 1939. AMAPÁ, MURURÉ. T.: AM, São Paulo de Olivença; Ducke s/n (RB). Cat.: vulnerável (VU) B2abc. Alto Amazonas. Obs.: cf. *Brosimum utile* (HBK) Pittier, fide Berg, C.C., *Flora Neotropica* 7: 194, 1972.

*B. melanopotamicum* C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 19: 327, 1970. LEITEIRO. T.: AM, Santa Isabel, Rio Negro; Pires 247 (US). Cat.: não avaliado (NE). Ao longo do Rio Negro até Manaus.

*B. ovatifolium* Ducke, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 25, 1922. TURURI. T.: PA, Gurupá; Ducke s/n (RB). Cat.: vulnerável (VU) B2ab. AM. Obs.: cf. *Brosimum utile* (HBK) Pittier, fide Berg, C.C., *Flora Neotropica* 7: 197, 1972.

*B. parinarioides* Ducke, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 27, 1922. AMAPÁ-RANA. T.: PA, Óbidos; Ducke s/n (RB, Isotipo: HAMP). Cat.: não avaliado (NE). Alto e Baixo Amazonas.

*B. potabile* Ducke, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 26, 1922. AMAPÁ-DOCE. LT.: PA, Faro; Ducke s/n (RB, HAMP). Cat.: não avaliado (NE). Alto e Baixo Amazonas.

*B. rubescens* Taubert, Bot. Jahrb. 12(27): 3, 1890. AMAPÁ-PAU-VERMELHO. T.: RJ, entre Mendanha e Realengo; Glaziou 12169 (B, Isotipo: F). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt)AM e R J.

*Castilla* Cerv.

- C. ulei* Warburg, Bot. Jahrb. 35: 674, 1905. CAUCHO. LT.: AM, Rio Juruá, Murray; Ule 5359, fem. (B). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas. Obs. *Castilla elastica* Sessé é espécie muito cultivada na Amazonia.

*Cecropia* Loefling

- C. carbonaria* Martius ex Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 144, 1853. AMBAÚBA. Am. Trop. T.: GO, Meia Ponte; Pohl (BR). Cat.: não avaliado (NE). GO.
- C. catarinensis* Cuatrecasas, Brittonia 11: 171, 1959. EMBAÚBA. T.: SC, Laguna, na restinga; Reitz & Klein 177 (US). Cat.: não avaliado (NE). Sudeste e Sul.
- C. concolor* Willdenow, Sp. Pl. 4: 652, 1806. SAMBAÍBA, GURAÚVA. T.: PA, Belém; Sieber (S). Cat. não avaliado (NE). AM, PA e MT.
- C. dielsiana* Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 8: 362, 1923. EMBAÚBA. T.: AC, Rio Branco, "in Merytisal bei S. Marcos"; Ule 7891 (B). Cat.: não avaliado (NE). AC e RO.
- C. distachya* Huber, Bol. Mus. Goeldi 6: 65, 1910. EMBAÚBA. T.: PA, Santa Isabel; Goeldi, Hamp 7728 (MG, Isotipo: U). Cat.: não avaliado (NE). AM, PA e MT.
- C. engleriana* Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 8: 365, 1923. EMBAÚBA. T.: AC, Rio Acre, Seringal São Francisco; Ule 9313 (B). Cat. não avaliado (NE). AC e RR.
- C. ficifolia* Snethlage, Notzbl. Bot. Gart. Berlin 8: 365, 1923. EMBAÚBA. T.: AM, Rio Juruá Mirim; Ule 5588 (B). Cat. não avaliado (NE). AM, AC e RO.
- C. francisci* Snethlage, Notzbl. Bot. Gart. Berlin 8: 369, 1923. CETICO. T.: AC, São Francisco, Seringal São Francisco, Rio Acre; Ule 2312 (B). Cat.: não avaliado (NE). AC.
- C. glazioui* Snethlage, Notzbl. Bot. Gart. Berlin 8: 358, 1923. EMBAÚBA-VERMELHA. T.: RJ, Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca; Glaziou 18449 (G e P, Isotipo: Petrópolis, Santo Antonio; Glaziou 11559 (P). Cat.: não avaliado (NE). Sudeste e Sul.
- C. hololeuca* Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 148, 1853. EMBAÚBA-PRATEADA. T.: "Brasilia mediterranea"; Pohl (W). Cat.: não avaliado (NE). Nordeste, Sudeste e Sul.
- C. latiloba* Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 147, 1853. EMBAÚBA. T.: AM, Rio Japurá; Martius (M). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- C. lisboana* Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 9: 171, 1924. EMBAÚBA. T.: MA, Turiaçu; Snethlage 283 (B). Cat.: não avaliado (NE). MA.
- C. lyratiloba* Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 144, 1853. EMBAÚBA. T.: MG, Rio São Marcos; Pohl s/n (F). Cat.: não avaliado (NE). MG e GO.
- C. maranhensis* Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 9: 172, 1924. EMBAÚBA. T.: MA, Turiaçu; Snethlage 384 (G). Cat.: não avaliado (NE). MA.
- C. membranacea* Trécul, Ann. Sc. Nat. Sér. 3. 8: 83, 1847. CETICO. T.: (P). Cat.: não avaliado (NE). AC, AM. Obs.: O holótipo é de procedência duvidosa
- C. montana* Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 8: 368, 1923. EMBAÚBA. T.: Peru. Cat.: não avaliado (NE). AM.
- C. obtusa* Trécul, Ann. Sc. Nat. Sér. 3. 8: 79, 1847. EMBAÚBA-PRETA. LT.: Guiana Francesa; Leprier (P). Cat.: não avaliado (NE). PA e AP.
- C. pachystachya* Trécul, Ann. Sc. Nat. 3(8): 80, 1847. EMBAÚBA. LT.: MG, Curvelo; P. Claussen 158 (P, Homeótipo: MG, Curvelo, Fazenda Gustavo Silveira, ex Riacho Fundo; Carauta 1502 & 1503, 31-III-1972, GUA, R, RB, in Albertoa 3(14): 138, 1992). Cat.: não avaliado (NE). Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.
- C. palmata* Willdenow, Sp. Pl. 4(2): 652, 1806. EMBAÚBA. T.: PA, Belém; Sieber ex Herb. Hoffmannsegg (US). Cat. não avaliado (NE). AM e PA.

- C. paludosa* Warburg ex Glaziou, Bull. Soc. Bot. France 59 Mém. 3:645. 1913 (1912). AMBAÍBA. T.: RJ, Alto Macaé de Nova Friburgo; Glaziou 19863 (P). Cat.: não avaliado (NE). RJ.
- C. peltata* L., Pugill. Pl. Jamaic. Amoen. Acad. 5: 410, 1760. EMBAÚBA. T.: Jamaica (LNN). Cat.: não avaliado (NE). Da Região Norte ao México.
- C. purpurascens* C.C. Berg, Acta Amazônica 7(2): 185. 1977. T.: AM, Manaus, Estrada do Aleixo; Berg & Steward 264 (P, Isotipo: INPA, K, MO, NY, P, U, US, COL, RB, U, VEN e Z). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- C. saxatilis* Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 75(8): 360. 1924 (1923). EMBAÚBA. T.: PI, "Falsen der Serra Branca"; Ule 7174 (B). Cat.: não avaliado (NE). PI.
- C. sciadophylla* Martius, Flora 24/1 (2): 93, 1841. TÓREM, CETICO. T.: AM, Rio Japurá, perto de Porto Piranhas; Martius 630-1 (M). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- C. silvae* C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 21(6): 655. 1972. T.: PA, Rio Jari, Monte Dourado; N. T. Silva 956 (U, Isotipo: MG, NY). Cat.: não avaliado (NE). PA.
- C. ulei* Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 8: 361, 1923. EMBAÚBA. T.: AM, Manaus, rio Negro, perto da Cachoeira Grande; Ule 8838 (B, Isotipo: G e MG). Cat.: não avaliado (NE). AM e PA.

#### *Clarisia* Ruiz et Pavón

- C. biflora* Ruiz & Pavón, Syst. Veg. Fl. Peruv. & Chil. :255, 1798. OITI-AMARELO. T.: Ruiz & Pavón s/n (Madri). Cat.: não avaliado (NE). AC, PA e MT.
- C. ilicifolia* (Sprengel) Lanjow & Rossberg, Rec. Trav. Bot. Neerl. 33: 717, 1936. JANITÁ. T.: Brasil (B, Isotipo: F). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AM e RJ.
- C. racemosa* Ruiz & Pavón, Syst. Veg. Fl. Peruv. & Chil. :255, 1798. GUARIÚBA. T.: Chinchao et Pozuzo; Ruiz & Pavón s/n, (Madri). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AM e RJ.

#### *Coussapoa* Aublet

- C. angustifolia* Aublet, Pl. Gui. 2: 956, t. 363. CAIMBÉ. T.: Guiana Francesa; Aublet (BM). Cat.: não avaliado (NE). AP e PA.
- C. arachnoidea* Akkermans & C.C. Berg, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. ser. C 85(4): 442, 1982. CAIMBÉ. T.: AP, Rio Araguari; Pires & al. 50656, fem. (IAN, Isotipos: M, MG, NY, OXF, US e VEN. Cat.: não avaliado (NE). AP.
- C. asperifolia* Trécul, Ann. Sc. Nat. Bot. Sér. 3(8): 96, 1847. CAIMBÉ. LT.: Surinam; Hostmann 1189, masc. (P, HB, G, K, LE e U). Cat.: não avaliado (NE). AP e PA.
- C. crassivenosa* Mildbraed, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 15: 784, 1942. CAIMBÉ. T.: Equador, Pastaza, perto de Mera, cerca de 1000 msm.; Schultze. Rhonhof 2783, masc. (B). Cat.: não avaliado (NE). RR.
- C. cupularis* Akkermans & C.C. Berg, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Ser. C 85(4): 448, 1982. CAIMBÉ. T.: RO, Porto Velho; J.F. Silva 69, fem. (IAN). Cat.: não avaliado (NE). RO.
- C. curranii* Blake, Contrib. U. S. Nat. Herb. 20(7): 237, 1919. CIPOEIRO. T.: BA, Rio Gongoji; Curran 8 (US, Isotipo: RB). Cat.: vulnerável (VU) B2ac. Sudeste e Sul.
- C. ferruginea* Trécul, Ann. Sc. Nat. Sér. 3(8): 93, 1847. CAIMBÉ. T.: Guiana Francesa; Leprieur, masc. (P, Isotipo: V, GH, L e U). Cat.: não avaliado (NE). AP.
- C. floccosa* Akkermans & C.C. Berg, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Ser. C, 85(4): 451, 1982. CAIMBÉ. T.: MG, Viçosa; Kuhlmann 2074, fem. (RB, Isotipo: U, US). Cat.: vulnerável (VU) B2ab. MG.
- C. latifolia* Aublet, Pl. Gui. 2: 955, t. 362, 1775. CAIMBÉ. T.: Guiana Francesa; Aublet, fem. (BM). Cat.: não avaliado (NE). AP, PA e MA.

- C. magnifolia* Trécul, Ann. Sci. Nat. Bot. Ser. 3 (8): 98, 1847. CAIMBÉ. T.: Peru; Ruiz & Pavon. FI; (Isotipos: B, BM, F, US). Cat.: baixo risco (LR), AC, AM, MT, RO, RR.
- C. microcarpa* (Schott) Rizzini, Dusenya 1(5): 295, 1950. CAIMBÉ. T.: Neótipo, RJ, Rio de Janeiro, Estrada da Vista Chinesa, km 2,5, pouco antes da guarita do Parque Nacional da Tijuca; J.P.P. Carauta 1714 & C.A.L. de Oliveira 919 (9-IX-1944), GUA 42885; Isonéotipos: BG, F, HAS, HB, IAN, ICN, IPA, R, RB, RBR, RFA, RUSU, SP, SPF, UB, UEC, UFP; Topótipos: S.R. Sodré 1 & D.O. Sodré 1 (21-IX-1988) GUA 34170; Isotopótipos: F, RB. Cat.: baixo risco (LR). Nordeste, Sudeste e Sul.
- C. nitida* Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 133, t. 44, 1853. CAIMBÉ. LT.: PA, Jaguari; Martius, masc. (M, BR e U). Cat.: não avaliado (NE). AM, PA e AC.
- C. orthoneura* Standley, Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Sér., 17: 165, 1937. CAIMBÉ. T.: AM, São Paulo de Olivença, perto de Palmares. Krukoff 8518, fem. (NY, Isotipo: A, B, BM, F, G, K, LE, MO, SU, U e US). Cat.: não avaliado (NE).
- C. ovatifolia* Trécul, Ann. Soc. Nat. Sér. 3. 8: 95, 1847. CAIMBÉ. T.: Peru, Huánaco, Macora; Ruiz & Pavón, fem. (FI, Isotipo: F e US). Cat.: não avaliado (NE). RO, AM e AC.
- C. pachyphylla* Akkermans & C.C. Berg, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Sér. C 85(4): 459, 1982. CAIMBÉ. T.: BA, Santa Cruz de Cabralia, estrada velha para Santa Cruz, cerca de 15km NW de Porto Seguro; Mori & Santos 11655, fem. (CEPEC). Cat.: não avaliado (NE). BA.
- C. parvifolia* Standley Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Sér., 17: 165, 1937. CAIMBÉ. T.: AM, São Paulo de Olivença, perto de Palmares; Krukoff 8273, fem. (NY, Isotipo: A, BM, F, G, K, LE, MO, S, U e US). Cat.: não avaliado (NE). AM e PA.
- C. rhamnoides* Standley, Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Sér., 17: 166, 1937. CAIMBÉ. T.: AM, São Paulo de Olivença; Krukoff 8406, fem. (NY, Isotipo: A, HBM, F, G, K, LE, MO, S e U). Cat.: não avaliado (NE). AM e PA.
- C. scabra* Akkermans & C.C. Berg, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Sér. C 85(4): 460, 1982. CAIMBÉ. T.: RO, Rio Ouro Preto, afluente do Rio Pacaás Novos; Kuhlmann 470, fem. (RB, Isotipo: U). Cat.: não avaliado (NE). RO.
- C. tessmannii* Mildbraed, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 10: 413, 1928. CAIMBÉ. T.: Peru, Loreto, foz do Rio Santiago; Tessmann 4673, fem. (B, Isotipo: G, S). Cat.: não avaliado (NE). AM, PA e RO.
- C. trinervia* Spruce ex Mildbraed, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 10: 416, 1928. CAIMBÉ. T.: Venezuela, Rio Casiquiare, entre o lago de Vasiva e o Rio Pacimoni; Spruce 3464, fem. (B, Isotipo: BM, BR, G, GH, K, LE, NH, P e OXF). Cat.: não avaliado (NE). PA, AM, MA e MT.
- C. villosa* Poeppig & Endlicher, Nov. Gen. et Sp. 2: 33. t. 147, 1848. T.: Peru, Huánaco: Casapi; Poeppig, masc. (B, Isotipo: OXF). Cat.: baixo risco (LR). AM, PA, MT. Obs.: É a espécie do gênero com maior distribuição e número de indivíduos.
- C. viridifolia* Cuatrecasas, Fieldiana, Bot., 27(1): 213, 1951. T.: Venezuela, Bolívar, até 8 km ao norte de Santa Teresita de Kavanayen; Steyermark 60456, masc. (F, Isotipo: VEN). Cat.: não avaliado (NE). AM e RR.

#### *Dorstenia* Linnaeus

- D. albertorum* Carauta, Valente & Sucre, Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 17(2): 63, 1974. CAIAPÍ. T.: ES, Mimoso do Sul, vertente sudeste do morro, 30 msm.; Sucre & Soderstrom 8920 (RB). Cat.: em perigo (EN) B2bc. BA e ES.
- D. amazonica* Carauta, Valente & Barth, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 23: 105, 1979. CAIAPÍ-AMAZÔNICO. T.: TO, Araguaia, Fazenda Boa Vista; Carauta 1863 (RB, Isotipos: GUA, HB, R). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AM, TO. Obs.: Difere de *D. sabanensis* Cuatr. pelo

- maior número de nervuras secundárias e pelo ápice da lâmina foliar e de *D. pernambucana* pela margem irregular do cenanto.
- D. appendiculata* Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 162, 1853. CAIAPIÁ-DE-APENDICE. T.: BA, Rio das Contas, Serra Grande; Martius 2141 (M). Cat.: em perigo (EN) B2bc. BA e ES.
- D. argentata* J.D. Hocker, Bot. Mag. 95: 6/5795, 1869. CAIAPIÁ-PRATEADO. T.: SC; Müller 92 (K). Cat.: dados deficientes (DD). PR e SC.
- D. arifolia* Lamarck, Encycl. 2: 317, 1789. CARAPIÁ. T.: RJ; Dombey s/n (P). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. MG, RJ, ES e SP.
- D. asaroides* Gardner in Hooker, Icones Pl. 1(4): t. 399, 1841. CARAPIÁ-LIGA-OSSO. T.: CE, Crato; Gardner 2001 (K). Cat.: baixo risco (LR). RO, PA, MA, PI, CE, PE, RR, MT, GO, DF e MG.
- D. bahiensis* Klotzsch ex Fischer & Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 11: 64, 1846. CAIAPIÁ-DA-BAHIA. LT.: BA, Ilhéus; Luschnath (LE, B, BR, F e LE). Cat.: vulnerável (VU). PE e BA.
- D. bonijesu* Carauta & Valente, Atas Soc. Bras. RJ 1(20): 111, 1983. CAIAPIÁ-DE-BOM JESUS. T.: Rio de Janeiro, Bom Jesus do Itabapoana, Carabuçu, Fazenda São Jorge; Carauta 4400, C.M. Rizzini 217; M.T.S. Séchy 47, M.T. Rosa 101 & H. Lima 98 (RB, Isotipos: BC, CEPEC, COIM, COL, CTES, GUA, HB, HBR, NIT, R, RBR, RFA, SP, U, UNB, USP, US e VIC). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc, C. RJ e ES.
- D. bowmaniana* Backer, Refug. Bot. 5(1): t. 303, 1873 (1871). CAIAPIÁ-DO-BOWMAN. T.: RJ; Bowman (K). Cat.: rara, em perigo(EN) B1, 2ce. RJ.
- D. brasiliensis* Lamarck, Encycl. Bot. 2: 317, 1986. LIGA-LIGA. T.: Brasil; Commerson (P, Isotipo: G). Cat.: baixo risco (LR). MG, MT, MS, SP, PR e RS.
- D. capricorniana* Carauta, Valente & Sucre, Ciência e Cultura 28(3): 357, 1976. FIGUEIRINHA-CAPRICÓRNIO. T.: RJ, Rio das Flores, Fazenda Santa Genoveva, entre 500 e 600 msm.; Sucre 7763 (RB). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. MG, RJ e SP.
- D. carautae* C.C. Berg, Proceed. Konink. Ned. Akad. Wet. C 89(2): 136, 1986. CAIÁPIA. T.: SP, Eldorado, perto da Gruta da Tapagem; Carauta 1277 (RB). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. Sudeste e Sul.
- D. cayapia* Vellozo, Fl. Flum. 52, 1829 (1825); Icones 1: t. 137, 1831 (1827); in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro 5: 51, 1881; Vellozia 7: 32, 1969. CAIAPIÁ. LT.: Vellozo, Fl. Flum. Icones 1: t. 137, 1831 (1827). Cat.: próxima a ameaçado (LR, nt). RJ, BA, MG e ES.
- D. conceptionis* Carauta, Bol. Mus. Bot. Curitiba 17: 1, 1974. CAIAPIÁ. T.: ES, Jatibucas, Itarana, desmembrado de Itaguaçu. (RB). Cat.: em perigo (EN) B2bc. ES.
- D. contensis* Carauta & C.C. Berg, Botany Proceedings C 88 (3): 261, 1985. CAIAPIÁ-DO-RIO-DAS-CONTAS. T.: BA, Vale do Rio das Contas, Ipiáu, Estrada para Itaibá; T.S. Santos 1265 (CEPEC, Isotipos: RB e U). Cat.: em perigo (EN) B2bc. BA.
- D. contrajerva* L., Sp. Pl. 1: 121, 1753. CONTRA-ERVA. T.: (LINN). Cat.: baixo risco (LR). PA.
- D. dolichocaula* Pilger, Fedde Repert. 41: 222, 1937. CAIRAPIÁ. Neótipo: Resende, Visconde de Mauá, Vale do Rio Preto; Carauta 1387 (RB, Isotipos: F, GUA, K e R). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. RJ.
- D. elata* W.J. Hooker, Icon. Plant. 1(3): t.220, 1839. CAIAPIÁ. T.: RJ, Serra do Órgãos; Gardner 621 (K, Isotipos: BM, BR, G, NY, P e US). Cat.: em perigo (EN) B2bc. RJ, ES.
- D. erecta* Vellozo, Fl. Flum. 53, 1829 (1825); Icones 1: t. 142, 1831 (1827); in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro 5: 52, 1881. CAIÁPIA-ERECTO. LT.: Vellozo, Fl. Flum. Icones 1: t.142, 1831. Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. RJ.

- D. ficus* Vellozo, Fl. Flum. 53, 1829 (1825); Icones 1: t. 138, 1831 (1827); in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro 5: 52, 1881. FIGUEIRA-TERRESTRE. LT.: Vellozo, Fl. Flum. Icones 1: 6. 138, 1831 (1827). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bcd. RJ.
- D. fischeri* Bureau, in DC, Prodrum 17: 277, 1873. CONTRA-ERVA. T.: RJ, Macaé; Riedel s/n (LE). Cat.: em perigo crítico (CR) B1. RJ.
- D. gracilis* Carauta, Valente & Araujo, Bull. Torr. Bot. Club 103(4): 172, 1976. CAIAPIÁ-DELGADO. T.: ES, Reserva Florestal de Linhares, DOCEMAD, cerca de 45 msm.; Sucre 8628 (RB). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. ES e RJ.
- D. grazielae* Carauta, Valente & Sucre, Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 16(2):59, 1 t., 1973. CAIAPIÁ-DA-GRAZIELA. T.: Rio de Janeiro, Parati, meio da serra; Carauta 1411 (RB, Isotipos: F, GUA, K e SP). Cat.: em perigo (EN) B2bc. SP e RJ.
- D. heringeri* Carauta & Valente, Bradea 2(5): 17, 1975. CAIAPIÁ-DO-HERINGER. T.: DF, Brasília, setor gráfico; Heringer 14350 (UNB, Isotipos GUA e RB). Cat.: em perigo (EN) B2bc. DF e GO.
- D. hildegardis* Carauta, Valente & Barth, Rev. Bras. Biol. 38(3): 613, 1978. CAIAPIÁ-HILDEGARDE. T.: ES, Domingos Martins, campinho, caminho para Chapéu; Carauta 1811 (RB, Isotipos: F, GUA, HB, K, NY, R, SP, U e UB). Cat.: em perigo (EN) B2bc. ES.
- D. hirta* Desvaux, Mém. Soc. Linn. Paris 4: 218, 1826. CAIAPIÁ-HIRTO. T.: "Herbier de A.N. Desvaux, donné par Mme Vce. Lavallée en 19896. Habitat in Brasília" (P). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. BA, RJ, PR e SP.
- D. lagoensis* Bureau, in DC, Prodrum 17: 268, 1873. CAIAPIÁ-DA-LAGOA-SANTA. T.: MG, Lagoa Santa; Warming 1940/3 (C). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. MG.
- D. longifolia* Moricandi, Pl. Amér. 90, t.58, 1840. CAIAPIÁ-DE-FOLHA-LONGA. T.: BA; Blanchet 1960 (G, Isotipo: BM). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. BA, ES e RJ.
- D. maris* Valente & Carauta, Trab. XXVI Congr. Nat. Bot. Rio de Janeiro, 1975:1977. CAIAPIÁ-DA-SERRA-DO-MAR. T.: RJ, Angra dos Reis, Fazenda Japuiba; M. Kuhlmann 2610 (SP). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. RJ.
- D. milaneziana* Carauta, Valente & Sucre, Bradea 1(48): 473, 1973. CAIAPIA-DO-MILANEZ. T.: ES; Sucre 8961 (RB, Isotipos: F, GUA, HB, MICH, R e SP). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. RJ e ES.
- D. paraguariensis* (Hassler) Carauta, Bradea 2(37): 256, 1978. CAIAPIÁ-PARAGUAIO. T.: Paraguai, San Luiz, entre os rios Apa e Aquidaba. Fiebrig 4296-4156 (K). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). MS.
- D. pernambucana* Arruda da Câmara, Discurso 45, 1810. BATATINHA-DE-TEIÚ. Neótipo: PE, Tapéira; Pickel s/n (IPA 6589, ex Herb Schol. Agric. S. Bento 1336). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). PE e BA.
- D. ramosa* (Desvaux) Carauta, Valente & Sucre, An. XXIII Congr. Nac. Bot. Garanhuns, 1972: 158, 1973. FIGUEIRA-TERRESTRE. T.: "Herbier de A. N. Desvaux" (P). Cat.: vulnerável (VU) B2bcd. RJ.
- D. schulzii* Carauta, Valente & Araujo, Bul. Torrey Bot. Club 103(4): 173, 1976. CAIAPÁ. T.: Argentina, Formosa; Schulz 18318 (CTES, Isotipos: F, IPA, LIL e RB). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. MS.
- D. setosa* Moricandi, Pl. Nouv. Amér. 103, t. 64, 1841. CAIAPIÁ-SEDOSO. T.: BA, Blanchet (G). Cat.: em perigo (EN) B2bc. BA e ES.
- D. strangii* Carauta, Bradea 42: 433, 1974. TIÚ. T.: MG, Bom Jardim de Minas, Serra da Mira, a 12 Km da sede Municipal; J.E. Saléh s/n (HB). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. MG.
- D. sucrei* Carauta, Bol. Mus. Bot. Curitiba 17: 2, 1974. TIÚ. T.:ES; Brade et al. 18278 (RB, Isotipos: F e GUA). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. ES e MG.

- D. tentaculata* Fischer & Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 11: 59, 1846. CAIAPIÁ-TENTACULADO. T.: Riedel s/n (B). Cat.: em perigo (EN) B2bc. RJ.
- D. tenuis* Bompland ex Bureau, in DC, Prodrromus 17: 264, 1873. VIOLETA-DA-MONTANHA. T.: Argentina, Corrientes; Bompland 973 (P). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). PR, SC e RS.
- D. tubicina* Ruiz & Pavón, Fl. Peruv. 1: 6, 5, t.102, fib. b. 1798. TAROPE. T.: Peru; Pavón 10395 (MA). Cat.: baixo risco (LR). AM, PA, PI, CE, MT, MG e SP.
- D. turneraefolia* Fischer & Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 11: 63, 1846. CAIAPIÁ. T.: RJ, Corcovado; Riedel & Luschnath 1011 (LE). Cat.: vulnerável (VU) B2bcd. ES e RJ.
- D. urceolata* Schott, Flora Reg. 4(1):197, 1821. CAIAPIÁ-DE-URNA. Neótipo: RJ, Petrópolis, Serra da Estrela, meio da serra (RB). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. RJ
- D. vitifolia* Gardner, in Field., Sert. Pl. 1: 6. 14, 1843. FIGUEIRINHA. T.: GO; Garner 3427 (BR, Isotipo: G e K). Cat.: baixo risco (LR). MT, GO, MG, SP e PR.

#### *Ficus* Linnaeus

- F. albert-smithii* Standley, Lloydia 2 (3): 174, 1939. FIGUEIRA-DO-ALBERTO. T.: República da Guiana, região Sudeste e Noroeste das Montanhas Kanuku, no cume do monte Iramaikpang, 977 msm.; A.C. Smith 3651 (F, Isotipo: B, IAN, K, NY, P e US). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AM, PA.
- F. amazonica* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 298, 1867. FIGUEIRA-AMAZÔNICA. T.: AM, Rio Negro; Martius 88/89 (M, Isotipo: U). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AP, AM e PA.
- F. aripuanensis* C.C. Berg & Kooy ex Vázquez Ávila & alii, Supl. Acta Amazônica 14(1/2): 195, 1986 (1984). FIGUEIRA-DE-ARIPUANÃ. T.: MG, Aripuanã, Rio Aripuanã, Salto dos Dardaneles; Berg & alii 18477 (P, Isotipo: MG). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. PA, MT.
- F. arpazusa* Casaretto, Nov. Stirp. Bras. Dec. 1: 15, 1842. GAMELEIRA-PRETA. T.: RJ, Rio de Janeiro; Casaretto 1234 (TO). Cat.: baixo risco (LR). RO, AC, RR, PA, BA, RJ, SP e PR.
- F. blepharophylla* Vazquez Ávila ex Vázques Ávila & al., Supl. Acta Amazônica 14 (1/2): 197, 1986 (1984). MULEMBÁ. T.: RR, Serra do Paraná; Ule 7987 (MG, Isotipo: G, L e SI). Cat.: em perigo (EN) B1, 2bc. RR.
- F. broadwayii* Urban, Fedee, Repert. 15: 110, 1917. GAMELEIRA-DO-CERRADO. T.: Antilhas, Ilha de Tobago, perto de Lambeau, à margem do Rio Kings Ray, Scarborough, Burnett Street; Broadway 4382 (B, Isótipo: US, Parátipo: Broadway 4768). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). RO, CE, BA e DF.
- F. calyptroceras* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Lugd. Bat. 3: 297, 1867. GAMELEIRA-BRANCA. T.: PI, Paranaguá; Gardner 2729 (K). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. PI, BA, MG, MS e GO.
- F. carautana* Neves & Mello Filho, Bradea 6(5): 37, 1992. FIGUEIRA-SILVESTRE. T.: MG, Rio Paraguai, Estação Ecológica de Taimã, na margem do rio; Luiz Emygdio de Mello Filho & alii 5078 (RB). Cat.: em perigo (EN). B1, 2bc. MT.
- F. castellviana* Dugand, Caldasia 4: 33, 1942. FIGUEIRA-DE-RONDÔNIA. T.: Colômbia, Comisaria del Putumayo, Mocoa, residuos de selva higrófila bacia Pueblo Viejo, 580-600 msm.; Cuatrecasas 11386 (COL, Isotipo: US). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. RO e BA.
- F. catappifolia* Kunth et Bouché ex Kunth. Enum.: 14, 1847. FALSA-CATAPA. T.: (LE). Cat.: dados deficientes (DD). AC, AM, PA, AP, MA e MT. Obs.: Planta cultivada na Europa procedente da Martinica, nas Antilhas. Possivelmente o holótipo acha-se em Leningrado.
- F. christianii* Carauta, Albertoa 3(22): 248, 1994. GAMELEIRA-DO-NORTE. T.: Maranhão, região do Rio Maracassumé, mata da Cachoeira, em solo arenoso, terra firme; Fróes et Krukoff 1938 (NY, Isotipo: F, K e P). Cat.: em perigo (EN) B2bc. PA e MA.

- F. clusiifolia* Schott, in Sprengel, Syst. Veg. 4(2): 409, 1827. FIGUEIRA-VERMELHA. T.: Brasil; Schott (B). Cat.: baixo risco (LR). BA, ES, MG, SP, RJ, GO, AP, PA, AM e AC.
- F. cyclophylla* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Lugd. Bat. 3: 297, 1867. GAMELEIRA-GRANDE. T.: PE; Schornbaum (U). Cat.: em perigo (EN) B2bcd. MA, PB, PE, RN, MG e RJ.
- F. dendrocida* Humboldt, Bonpland & Kunth, Nova Genera 2: 46, 1817. MATA-PAU. T.: Colombia, Mompos, margem do Rio Magdalena; Bonpland 1502 (F, Isotipo: P). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. PA.
- F. donnell-smithii* Standley, Contr. U.S. Nat. Herb. 20(1): 21, 1917. FIGUEIRA-DA-MATA. T.: Guatemala, Departamento Alta Verapaz, Cubilquit, 350 msm.; H. von Türckheim II. 5976 et J. Donnell Smith 8289 (US, Parátipo: J. Donnell Smith 7773, GU e US). Cat.: baixo risco (LR). AC.
- F. elliotiana* Sp. Moore, Trans. Linn. Soc. London 2(4): 471, 1895. FIGUEIRA-DO-PANTANAL. T.: MS, Corumbá; Spencer Moore 1040a (BM). Cat.: em perigo (EN) B2bc. MG e MSul.
- F. enormis* (Martius ex Miquel) Miquel, Ann. Mus. Lugd. Bat. 3: 298, 1867. FIGUEIRA-DE-PEDRA T.: SP, Aparecida, e, MG, Parapitinga; Martius (F 18823 ex M). Cat.: baixo risco (LR). Cresce em todas as regiões do Brasil. Obs.: Sintipo de Martius - duas amostras, uma de São Paulo e a outra de Minas Gerais, Paapitinga, entre rios do Peixe e Ingai, região atual de Três Corações, Luminárias, Ingai, Itumirim e Carmo da Cachoeira. Torna-se difícil localizar de modo exato a Fazenda Parapitinga.
- F. glabra* Vellozo, Fl. Flum. Icones 1: t. 50, 1831 (1827). FIGUEIRA-BRAVA. LT.: Vellozo, Flora Fluminensis Icones 1. 6. 50. Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). BA, MG, RJ, SP, PR, RS e MS.
- F. gommeira* Kunth et Bouché ex Kunth, Enum. syn. *Ficus* 18, 1847. GAMELEIRA. T.: não localizado. Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). AM, PA, AP, MA, PI, MG, RJ, SP, PR e MT.
- F. greiffiana* Dugand, Caldasia 4: 49, 1942. FIGUEIRA-DE-GREIF. T.: Colômbia, Comisaria del Caquetá, Florencia, Buena Vista, 450 msm.; Cuatrecasas 8884 (COL). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AM e AP.
- F. guaranitica* Chodat ex Chodat & Vischer, Bull. Soc. Bot. Genève 2(11): 254, 1919 (1920). GUAPÓI. T.: Paraguai, in sylvis virgineis, c. de Altos; Hassler 805 (K). Cat.: baixo risco (LR). SP, PR, SC, RS, MS e GO.
- F. guyanensis* Desvaux ex Hamilton, Prodr. Pl. Ind. Occ. 62, 1825. FIGUEIRA-DA-GUIANA. T.: "Herb. Prof. Desv. Guyana" (P). Cat.: baixo risco (LR). RR, AC, AM, RO, AP, MA, BA e MT.
- F. hebetifolia* Dugand, Caldasia 4: 50, 1942. COAXINGUBA. T.: Colômbia, Comisaria del Caquetá, Florencia, Buena Vista, 450 msm.; Cuatrecasas 8880 (COL). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AC e PA.
- F. hirsuta* Schott, in Sprengel, Syst. Veg. 4(2): 410, 1827. MOLEMBÁ. T.: Brasil; Schott (B). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). BA, MG, RJ, SP e MS.
- F. insipida* Willdenow, Sp. Pl. 1143, 1806. FIGUEIRA-BRANCA. T.: Venezuela, Caracas; Bredemeyer 32 (B, Herb. Willdenow 19297, Isotipo: P). Cat.: baixo risco (LR). AM, AC, MG, PI, PA, RJ, SP, PR, SC, RS, DF, MT e GO.
- F. killipii* Standley, Field Mus. Chicago Bot. ser. 13: 304, 1937. AZEITE-MARIA. LT.: Peru, Junin, Rio Paucartambo, perto da Ponte Perené, 700 msm.; Killip et Smith 25252 (F, NY, US; Parátipo: Peru, Ayacucho, Vale do Choimacota, 700 m/s.m.; Weberbauer 7538). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AM e MT.
- F. krukovii* Standley, Field Mus. Chicago Bot. ser. 17(2): 171, 1937. FIGUEIRA-DE-KRUKOFF. T.: AM, São Paulo de Olivença, Bacia do Rio Belém; Krukoff 9002 (NY, Isolectótipos:

- BM, F, GH, K, U e US, Parátipo: Amazonas, Bacia do Rio Uruá, perto da foz do Rio Embira; Krukoff 4902, A, F, US). Cat.: baixo risco (LR). AC, AM, MT, MS e PA.
- F. lauretana* Vázquez-Ávila ex Vázquez-Ávila & alii, Supl. Acta Amazônica 14(1/2): 205, 1986. LAURETANA. T.: AM, São Paulo de Olivença; Krukoff 8740 (U, Isotipo: K, Parátipo: Acre, Itu; Kuhlmann 797, RB e U). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AC e AM.
- F. luschnathiana* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 298, 1967. GAMELEIRA-VERMELHA T.: RJ, Cabo Frio; Luschnat (U). Cat.: baixo risco (LR). RJ e MG.
- F. malacocarpa* Standley, Field Mus. Chicago 17(2): 172, 1937. CUMACABALI T.: República da Guiana, Curita; Persaud 100 (F, Isotipo: K). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AP, RR e MT.
- F. mathewsii* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 298, 1867. RENACO. T. Peru; Mathews 2059 (K). Cat.: baixo risco (LR). RO, AC, AM, RR, CE MT e BA.
- F. matiziana* Dugand, Caldasia 4(17):116, 1946. FIGUEIRA-DE-MATIZ. T.: Colômbia, cundinamarca, "caminho de herradura antiguo de Graduas a Honda; del Valle de Guaduas al Alto de Ficalito Vereda El Salto", 1200-1700 msm; Garcia-Barriga 11840 (Col, Isotipos: NY e US). Cat.: baixo risco (LR). RR e MT.
- F. maxima* Miller, Dict. 6, 1768, GUAXINGUBA-PRETA. T.: Sloane, Voyage to Jamaica 2, 140, t. 223. 1725 (B). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). AC, AM PA, AP, MG, MT e MS.
- F. mexiae* Standley, Field Mus. Chicago 17(2): 173, 1937. FIGUEIRA-DE-MÉXIA. T.: Minas Gerais, Fazenda de Aguada, Viçosa; Ines Mexia 5447 (B, Isotipo: BM, F, NY, RB, UC, US e VIC). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. MG.
- F. monckii* Hassler, An. Jard. Bot. Genève 21: 127, 1919. IBAPÓI, T.: Lectótipo: Paraguai Centreal, região do Lago Ypacaraí "in silvis Bernal cue flor. mens. Oct."; Hassler 12311 (G, Isotipo: K, NY e US; Parátipo: Hassler 6096, G). Cat.: baixo risco (LR). PR, SC e RS.
- F. nymphaeifolia* P. Miller, Dict. 9, 1768. APUÍ. T.: "Philip Miller collections at the British Museum", neg. no. 5285 (BM). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. RR, RO, PA, AP, BA, MT e GO.
- F. obtusifolia* Humboldt, Bonpland & Kunth, Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 49, 1817. ATRACA, PAU-DE-GAMELA. T.: México, Acapulco; Herbarium Humboldt & Bonpland 3884 (COL). Cat.: baixo risco (LR). RR, AM, PA, MA, PI, MG, MT, MS e GO.
- F. obtusiuscula* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 300, 1867. LOMBRIGUEIRA. T.: BA, in sylvis ad fl. Itahype; Martius (M, Isotipo: US). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). PA, MA, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, MS, GO e DF.
- F. organensis* (Miq.) Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3(7): 229 1867. GAMELEIRA-BRAVA, T.: RJ, Rio de Janeiro, Serra dos Órgãos; Gardner 620 (F). Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). MG, RJ, SP, PR, SC e RS.
- F. pakkensis* Standley, in Maguire, Bull. Torr. Bot. Club 73(3): 297, 1948. FIGUEIRA-DE-PAKKA. T.: Suninan, Pakka, Rio Saramacca; Maguire 23960 (A). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. PA, MA e GUIANAS.
- F. pallida* Vahl, Enum. pl. ed. 2: 174, 1805. PIVIJAÍ. T.: Colômbia, "ad St. Martham Dn. v. Rohr.", no litoral atlântico colombiano. Cat.: dados deficientes (DD). RO, AC, AM e GO.
- F. panurensis* Spruce ex Standley, Field Mus Chicago 17(2): 174, 1937. FIGUEIRA-DE-PANURÉ. T.: AM, "Panuré ad Rio Uaupés" Spruce 2768 (F, Isotipo: G, GH, MG, NY e P). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AM.
- F. paraensis* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 298, 1867. SACHA-OJÉ, T.: Lectótipo: PA, Martius 148 (M); Parátipo: PA, Martius 147 (M). Cat.: baixo risco (LR). RO, AC, AM, PA, AP e MT.
- F. perforata* L., Pl. Surin. 17, 1775. AMATE, T.: (LINN 1240.9). Cat.: baixo risco (LR). AM, PA e MT.

- F. pertusa* L.f., Suppl. pl. 442, 1781. UAUPIM-AÇU. T.: (LINN 1240.9). Cat.: baixo risco (LR). AP, RO, AC, AM MA, PE, MT, RJ, PR, SC, RS e MS.
- F. piresiana* Vásquez-Ávila & C.C. Berg ex Vásquez-Ávila & al., Supl. Acta Amaz. 14(1/2): 207, 1986. FIGUEIRA-DO-MURÇA-PIRES. T.: PA, Belém, em terrenos do Instituto Agrônômico do Norte (EMBRAPA); Murça Pires 2335 (IAN, Isotipo: RB; Parátipos: ibidem Murça Pires et Black 576, IAN). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. PA e AP.
- F. pulchella* Schott, in Sprengel, Syst. Veg. 4(2): 410, 1827. CAXINGUBA. T.: Brasil; Schott 50 ("Herb. Sprengel" F. 654944 ex B. 11711, K 5096). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. PA, MA, RJ, PR e SC.
- F. ramiflora* Standley, Field. Mus. Chicago 17(2): 175, 1937. RENAQUINHO. T.: AM, Humaitá, perto de Três Casas; Krukoff 6446 (F, Isotipo: NY). Cat.: em perigo (EN) B2bc. RR e AM.
- F. roraimensis* C.C. Berg ex Vázques-Ávila & al., Supl. Acta Amazônica 14(1/2): 187, 1986. FIGUEIRA-DE-RORAIMA. T.: RR, Rio Mucajaí, Colônia fernando; Black et Magalhães 51/12915 (IAN). Cat.: em perigo (EN) B2bc. RO.
- F. salzmanniana* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 299, 1867. FIGUEIRA-BAIANA, T.: BA, in sabulosis", Salzman (P ex Herb. E. Drake). Obs. Miquel coloca no texto da Flora Brasiliensis: Bahiae in collibus: Salzman"e na obra Principis: Cat.: em perigo (EN) B2bc. BA.
- F. schippii* Standley, Field Mus. Chicago 8: 7, 1930. FIGUEIRA-DE-SCHIPP. T.: Honduras Britânica, Middlesex, 60msm.; Schipp 334 (F, Isotipo: NY, US). Cat.: dados deficientes (DD). AM e MS.
- F. schultesii* Dugand, Caldasia 2(6): 78, 1943. GUAPORÉ. T.: Colômbia, vale do Rio Cedro, Departamento del Huila, Campos las Caeceras, sudoeste de Pitalito, 1300 msm.; R.E. Schultes et M. Villarreal 5208 (COL, Isotipo: US, Parátipo: Ibidem, Schultes 5176, COL; Isoparátipo: K). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AC.
- F. schumacheri* (Liebm.) Griseb., Fl. Br. West. Ind.:151, 1859. LEITEIRA. T.: "Trinidad", C. Cat.: dados deficientes (DD). PA.
- F. sphenophylla* Standley, Field. Mus. Chicago 17(2): 176, 1937. FIGUEIRA-ACREANA. T.: AC, perto da foz do rio Macuaã; afluente do Rio Iaco; Krukoff 5384 (A, Isotipo: BM, F. K, LP, NY e UC). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AC.
- F. tomentella* (Miquel) Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 297, 1867. FIGUEIRA-ROXA. T.: PA; Martius 183 (M). Cat.: baixo risco (LR). RJ e SP.
- F. trigona* L. f., Supl. pl. 441, 1781 MIUM. T.: Herb. Linnaeus 1240. 12. (LINN). Cat.: baixo risco (LR). RO, AM, PA, AP, CE, BA, MG, RJ, SP, SC, MT, MS e GO.
- F. trigonata* L. Pl. Surin. 17, 1775. CHIMÃO. T.: Plumier, Pl. Am., ed. Burmann, t. 132, Fig.1. 1757. Cat.: baixo risco (LR). RO, PA e GO.
- F. ursina* Standley, Field Mus. Chicago 17(2): 178, 1937. COAJINGUBA. T.: AC, bacia do Rio Purus, perto da foz do Rio Macuaã, afluente do Rio Iaco, Lat. 09°20' S, Long. 69°W, em terra firme; Krukoff 5686 (F, Isotipo: A, BM, LP, M e NY). Cat.: em perigo (EN) B2bc. AC.
- F. vaupesana* Dugand, Caldasia 4: 72, 1942. MITU. T.: Colômbia, Rio Uaupés, 200msm, Yurupari, Comisaria del Vaupés; Cuatrecasas 7308 (COL). Cat.: em perigo (EN) B2bc. AM.
- F. velutina* Humboldt et Bonpland ex Willdenow, Sp. Pl. 1141, 1806. MACHIMBI. T.: Colômbia, Herb. Humboldt & Bonpland 2102, limites dos departamentos del Cauaca e de Nariño, na montanha de Bateros, a Oeste do alto de la Campana, entre o rio Sambingo e o Rio Mayo, ao Norte de Sao Pablo (Nariño) ao Sul de Bolivar (Cauaca), segundo Dugand, Caldasia 2(9): 375, 1944 (P). Cat.: baixo risco (LR). AC, AM, RO e PA.

*Helianthostylis* Baillon

*H. sprucei* Baillon, *Adansonia* 11: 299, 1875. MURURÉ. LT.: AM, Rio Negro, São Gabriel; Spruce 2097 (P). Cat.: não avaliado (NE). AM.

*Helicostylis* Trécul

- H. elegans* (Macbride) C.C. Berg, *Acta Bot. Neerl.* 18: 464, 1969. AMORA, MICHO-CHAQUI. T.: Peru, Loreto, Iquitos, Mishuyacu; Klug 603, masc. (F). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- H. heterotricha* Ducke, *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* 2(4): 721, 1932. CASCADURA. T.: AM, Tonantins; Ducke s/n, masc. (RB). Cat.: em perigo (EN) B2bc. AM.
- H. pedunculata* Benoist, *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* 25: 298, 1919. CONDURU. LT.: Guiana Francesa, Charvein; Benoist 667, fem. (P). Cat.: não avaliado (NE). PA
- H. scabra* (Macbride) C.C. Berg, *Acta Bot. Neerl.* 18: 464, 1969. PAU-DE-LETRAS. T.: Peru, Loreto, Iquitos, Mishayacu; Klug 384, masc. (F). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- H. tomentosa* (Poeppig et Endlicher) Rusby, *Mem. Torrey Club* 6: 120, 1826. MÃO-DE-GATO. T.: AM, Tefé, Ega; Poeppig (P). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. AM e RJ.
- H. turbinata* C.C. Berg, *Acta Bot. Neerl.* 18: 464, 1969. CONDURU. T.: AM, São Paulo de Olivença; Krukoff 8832, fem. (US). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.

*Maclura* Gaudichaud

- M. brasiliensis* (Martius) Endlicher, *Gen. Pl. Suppl.* 4(2): 34, 1847. TATAÍBA. T.: Brasil Sudeste (U). Cat.: em perigo (EN) B2b, 3d. América Tropical. Obs.: Do Brasil só existe uma coleta no século XIX.
- M. mora* Grisebach, *Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen Phys. Cl.* 24: 86, 1879. MORA. T.: Argentina, Orán; Lorentz et Hieronymus 479, masc. (B, Isotipo: MO, NY - ex herb. Kuntze). Cat.: não avaliado (NE). Paraguai, Argentina e Bolívia. Obs.: Cresce na margem direita do Rio Paraguai, limites com o Mato Grosso do Sul, daí ser provável sua ocorrência em nosso país.
- M. tinctoria* (L.) D. Don ex Steudel, *Nomencl.* 2 (ed. 2): 87, 1841. TATAJUVA. LT.: Jamaica, "Sloane, *Hist. Jam.* 2: t. 158, f. 1, 1725". Cat.: próximo a ameaçado (LR, nt). Todo o Brasil até o México. Obs.: embora ocorra muitas vezes cultivada pelos frutos ou tinta do caule, a destruição do habitat pode tornar este táxon ameaçado.

*Maquira* Aublet

- M. calophylla* (Poeppig et Endlicher) C.C. Berg, *Acta Bot. Neerl.* 18: 464, 1969. CAROARA. T.: AM, Lago Ega (= Tefé); Poeppig s/n, masc. (P). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- M. coriacea* (Karsten) C.C. Berg, *Acta Bot. Neerl.* 18: 464, 1969. CAROARA. T.: Colômbia, Meta, Lhanos de San Martin; Karsten, masc. (LE). Cat.: não avaliado (NE). AM e MT.
- M. guianensis* Aublet., *Pl. Gui.* 2: 36, t. 389, 1775. MAQUIRA. T.: Guiana Francesa; Aublet s/n (BM). Cat.: não avaliado (NE). PA.
- M. sclerophylla* (Ducke) C.C. Berg, *Acta Bot. Neerl.* 18: 463, 1969. CAROARA. LT.: PA, Rio Branco de Óbidos; Ducke, masc. (RB). Cat.: não avaliado (NE). Baixo Amazonas.

*Naucleopsis* Miquel

- N. amara* Ducke, *Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro* 4: 6, 1925. CAPINURI-DE-ALTURA. LT.: PA, Rio Tapajós, perto das cataratas de Mangabal; Ducke, fem. (RB). Cat.: Não avaliado (NE). PA e AM.

- N. caloneura* (Huber) Ducke, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 38, 1922. TRAMOIA. T.: PA, perto do Rio Cuminá-Mirim; Ducke s/n, masc. (MG). Cat.: não avaliado (NE). Baixo Amazonas.
- N. concinna* (Standley) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl 18(3): 465, 1969. TRAMOIA. T.: AM, Humaitá, Livramento, no Rio Livramento. Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- N. glabra* Spruce ex Baillon, Hist. Pl. 6: 206, 1877. CAPINURI-DE-ALTURA, TRAMOIA. T.: AM, Panuré, Rio Uaupés; Spruce 2793, fem. (P). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas e Guianas.
- N. guianensis* (Mildbraed) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 465, 1969. TRAMOIA. T.: República da Guiana, Cuyuni River, abaixo de Akio Falls; Sandwith 698, fem. (B). Cat.: não avaliado (NE). AP.
- N. imitans* (Ducke) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 465, 1969. TRAMOIA. LT.: Peru, Loreto, foz do Rio Pébas; Ducke s/n, fem. (RB). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- N. inaequalis* (Ducke) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 465, 1969. OTRAMOIA. T.: AM, perto de Borba, no Rio Madeira; Ducke s/n, fem. (RB). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- N. jamariensi* C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 465, 1969. TRAMOIA. T.: RO, Papagaios, Rio Jamari; Kuhlmann s/n, fem. (RB). Cat.: não avaliado (NE). RO. Obs.: Só conhecida por uma coleta.
- N. krukovii* (Standley) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 465, 1969. TRAMOIA. T.: AM, São Paulo de Olivença, perto de Palmares. Krukoff 8159, masc. (NY). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- N. macrophylla* Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 120, t. 35, 1853. TRAMOIA. T.: AM, Rio Japurá; Martius s/n, fem. (M). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- N. oblongifolia* (Kuhlmann) Carauta, Albertoa 24: 262., 1944. ACÁ. LT.: RJ, Rio de Janeiro, Horto Florestal; pessoal do Horto Florestal s/n (RB). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. Sudeste, Nordeste e Norte. Obs.: as coletas são escassas.
- N. pseudo-naga* (Mildbraed) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 465, 1969. TRAMOIA. LT.: AC, Rio Acre, Seringal São Francisco; Ule 9321, masc. (B). Cat.: não avaliado (NE). AC.
- N. riparia* C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 464, 1969. TRAMOIA. T.: AM, Esperança, foz do Rio Javari; Ducke 1786, fem. (RB). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- N. stipularis* Ducke, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 11: 580, 1932. TRAMOIA. LT.: Pará, Rio Tapajós, perto das cataratas de baixo; Ducke s/n, masc. (RB). Cat.: não avaliado (NE). Baixo Amazonas e PA.
- N. ternstroemiflora* (Mildbraed) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 465, 1969. TRAMOIA. T.: Peru, Loreto, Yarina-Cocha no Rio Ucayali; Tessmann 5467, masc. (B). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- N. ulei* (Warburg) Ducke, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 38, 1922. TRAMOIA. LT.: Peru, Loreto, Iquitos; Ule 6257, fem. (B). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas e AM.

#### *Perebea* Aublet

- P. acanthogyne* Ducke, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 11: 579, 1932. CAXINGUBARANA. T.: Peru, Loreto, perto de Pébas. Ducke s/n, fem. (RB). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- P. angustifolia* (Poeppig & Endlicher) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 463, 1969. CAXINGUBARANA. LT.: Peru, Loreto, Yurimaguas; Poeppig s/n (ou 2270), masc. (P). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- P. glabrifolia* (Ducke) C.C. Berg, Acta Bot. Neerl. 18: 463, 1969. CAXINGUBARANA. T.: São Paulo de Olivença; Ducke s/n, fem. (RB). Cat.: em perigo crítico (CR) B1, 2bc. Alto Amazonas. Obs.: Só existe uma única coleta, feita em 1932.

- P. guianensis* Aublet, Pl. Gui. 2: 953, 6. 361, 1775. CAXINGUBARANA. T.: Guiana Francesa, ao longo do Rio Kourou, a 20 milhas do mar; Aublet s/n, fem. (P). Cat.: não avaliado (NE). Região Amazônica, PA e AM.
- P. mollis* (Poeppig & Endlicher) Huber, Bol. Mus. Emilio Goeldi 5: 334, 1909. CAXINGUBARANA. T.: AM, Ega; Poeppig s/n (ou 3070), masc. (P). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- P. tessmannii* Mildbraed, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 10: 185, 1927. CAXINGUBARANA. LT.: Peru, Loreto, foz do Rio Santiago, Pongo de Manseriche; Tessmann 4601, masc. (B). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.

***Pourouma* Aublet**

- P. acuminata* Martius ex Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1):130, t. 40, 1853. MAPATI. T.: AM, São Paulo de Olivença, perto de Palmares; Krukoff 8427, fem. (NY, Isotipo: A, BR, F, G, LE, P, S, U e US). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- P. apiculata* Spruce ex Benoist, Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) 28: 321, 1922. PURUMÁI. T.: AM, Rio Uaupés, perto de Panuré; Spruce 2865 (P, Isotipo: MG). Cat.: não avaliado (NE). AM, MT, RO e RR.
- P. bicolor* Martius, Sist. Mat. Med. Bras. 34, 1843. IMBAUBARANA, TAMAOQUARE, CARGUABA, MAPATIRANA. T.: Colômbia, Rio Caquetá, Puerto Miraña; Martius, fem. (M, Isotipo: U). Cat.: não avaliado (NE). RO, RR, PA, AC, MT, AP e AM.
- P. cecropiifolia* Martius, in Spix et Martius, Reise Bras. 3: 1130, 1830. IMBAUBARANA. LT.: PA e AM (Rio Negro); Martius (M). Cat.: não avaliado (NE). AM, PA e AC.
- P. cucura* Standley & Cuatrecasas, in Cuatrecasas, Fieldiana Bot., 28(1): 211. 1951. IMBAUBARANA-BRANCA. T.: Venezuela, Amazonas, Capihuara, Alto Casiquiare, alt. 118 msm.; Llewelyn Williams 15812 (F, Isotipo: G, NY, RB e US). Cat.: não avaliado (NE). AP, AM e MT.
- P. cuspidata* Mildbraed, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 10: 417. 1926, IMBAUBARANA. LT.: AC, confluência dos rios Juruá e Juruá Mirim; Ule 5719, masc. (B, F, G, GH e MG). Cat.: não avaliado (NE). AC e AM.
- P. digitata* Trécul, Ann. Sc. Nat. Sér. 3. 8:106. 1847. MAPATIRANA. LT.: Guiana Francesa; Poiteau, fem. (P e B). Cat.: não avaliado (NE). AP e PA. Obs.: Berg & Heusden consideram sinônimo de *Pourouma bicolor* Martius.
- P. elliptica* Standley, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Sér., 17: 181, 1937. MAPATI. T.: AM, São Paulo de Olivença, perto de Palmares; Krukoff 8388, masc. (NY, Isotipo: A, BR, F, G, LE, MO, P, S e U). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- P. essequiboensis* Standley, Lloydia 2: 175. 1939. IMBAUBARANA. T.: República da Guiana, Rio Essequibo, perto da foz do Onoro Creek; A.C. Smith 2731, masc. (F, Isotipo: A, G, MO, NY, P, S, U e US). Cat.: não avaliado (NE). AM, PA.
- P. ferruginea* Standley, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, Bot. Sér., 17: 181, 1937. MAPATIRANA. T.: AM, São Paulo de Olivença, Belém Creek; Krukoff 8807, masc. (NY, Isotipo: A e F). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- P. formicarum* Ducke, Tropical Woods 90: 9, 1947. MAPATI. LT.: AM, Rio Solimões, Tocantins; Ducke 1917, fem. (R, F e NY). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- P. guianensis* Aublet, Pl. Gui. 2:892. t. 341. 1775. AMAPATI, MAPATI. T.: Guiana Francesa, Rio Sinnamari; Aublet (BM, Isotipo: N,U, LE e S). Cat.: baixo risco (LR). PA, AM e MT, Regiões Sudeste e Sul.
- P. maroniensis* Benoist, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 28: 318, 1922. POROMA. T.: Guiana Francesa; Godebert, masc. (P). Cat.: não avaliado (NE). AP e PA.

- P. melinonii* Benoist, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 28: 318, 1922. MAPATIRANA. LT.: Guiana Francesa, La Mana; Sagot 990, fem. (P e B). Cat.: não avaliado (NE). AP, AM, MT e PA.
- P. minor* Benoist, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 30: 103, 1924. PURUMAI, CARAMURI, TORENA. LT.: Guiana Francesa, Saint Jean de Maroni; Benoist 960, fem. (P). Cat.: não avaliado (NE). AC, AM, MT, PA, RR e RO.
- P. mollis* Trécul, Ann. Sc. Nat. Sér. 3. 8:102, 1847. AMAPÁ, UVA-DE-MACACO. LT.: Guiana Francesa; Leprieur (P e G). Cat.: não avaliado (NE). PA, AP, BA e ES.
- P. myrmecophila* Ducke, Bull. Hist. Nat. Paris. Sér. 2. 4: 723, 1932. IMBAUBARANA. LT.: AM, Manaus, Cachoeira do Mindu; Ducke, masc. (RB, G, P, S e US). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- P. ovata* Trécul, An. Scien. Nat. 3 (1): 101, 1847. IMBAUBARANA. T.: PA; Ferreira, masc. (P). Cat.: não avaliado (NE). PA.
- P. saulensis* C.C. Berg, Brittonia 34(1): 36, t. 1, 1982. IMBAUBARANA. T.: Guiana Francesa, Saul, km 2,7, na estrada para Montagne Belvédère Sud; Oldeman B. 4132, fem. (U, Isotipo: CY, P e VEN). Cat.: não avaliado (NE). AP.
- P. tomentosa* Martius ex Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1):128, t. 38, 1853. AMBAÚVA-DO-VINHO. LT.: Colômbia, Amazônas ou Caquetá, Aratacuara; Martius (M e U). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- P. triloba* Trécul, Ann. Sc. Nat. Sér. 3. 8:104, 1847. SUIA, SUIR, CHUÍNA. LT.: Peru, Huánaco, Macora; Ruiz & Pavón, masc. (P, G, OXF e US). Cat.: não avaliado (NE). AC. Berg e Heusden consideram sinônimo de *Pourouma mollis* Trécul.
- P. velutina* Martius ex Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 130, t. 41, 1853. MAPATIRANA, IMBAUBARANA. LT.: PA, foz do Rio Tocantins; Martius, masc. (M). Cat.: não avaliado (NE). AP, ES e BA.
- P. villosa* Trécul, Ann. Sc. Nat. Sér. 3. 8:103, 1847. IMBAUBA-BENQUÊ. T.: Guiana Francesa; Leprieur (1840), masc. (P). Cat.: não avaliado (NE). AP, RO, MA, PA e AM.

#### *Pseudolmedia* Trécul

- P. hirtula* Kuhlmann, An. Prim. Reun. Sul-Amer. Bot. 3: 76, 1940. FEIJÃO-CABOCLO. T.: RJ, Perto do Rio de Janeiro; Kuhlmann, masc. (RB). Cat.: em perigo (EN) B2bc. Sudeste e Sul.
- P. laevigata* Trécul, An. Sc. Nat. Sér. 3(8): 131, 1847. MARURÊ. T.: Peru; Ruiz & Pavón, masc. (FI, herb. Webb.). Cat.: não avaliado (NE). RO, MT e MG.
- P. laevis* (Ruiz & Pavón) Macbride, Field. Mus. Chicago 11(1): 16, 1931. CHIMICUA. T.: Peru, perto de Pozuzo; Ruiz & Pavón, masc. (HAL). Cat.: não avaliado (NE). Região Amazônica.
- P. macrophylla* Trécul, Ann. Sc. Nat. Sér. 3(8): 132, 1847. MURURÉ. T.: Peru. Ruiz & Pavón (FI, Herb. Weeb.). Cat.: não avaliado (NE). Região Amazônica.
- P. murure* Standley, Field. Mus. Chicago 17: 186, 1937. MURURÉ. T.: MA, região de Carutapera, estrada para Gurupi; Fróes 2023, fem. (NY). Cat.: não avaliado (NE). PA e MA.

#### *Sorocea* Saint Hilaire

- S. amazonica* Miquel, in Martius, Fl. Bras. 4(1): 111, 1853. SOROCA. T.: AM; Martius (M). Cat.: não avaliado (NE). AM e PA. Obs.: Cf. *Sorocea muriculata* Miquel, fide C.C. Berg & Akkermans, Proc. Kon. Ned., Akad. Wet. 88(4): 381, 1985.
- S. bonplandii* (Baillon) W. Burger, Lanjow & W. Boer, Acta Bot. Neerl. 11: 465, 1962. SOROCABA. T.: Argentina, Corrientes, "campamento taya" (P). Cat.: vulnerável (VU) B2bc. Sudeste e Sul.

- S. briquetii* Macbride, *Candollea* 4: 311, 1931. SOROCO. T.: Peru, perto de Tarapoto, San Martín; Spruce 4220, fem. Cat.: não avaliado (NE). AC.
- S. duckei* W. Burger, *Acta Bot. Neerl.* 11: 473, 1962. SOROCO. T.: PA, Santarém, Genipatuba; Ducke 193, fem. (RB). Cat.: não avaliado (NE). PA, AM.
- S. guayanensis* W. Burger ex W. Burger, Lanjow & W. Boer, *Acta Bot. Neerl.* 11: 439, 1962. SOROCO. T.: Venezuela, Rio Sanariapo, Amazonas; Williams 14532, fem. (F, Isotipo: G). Cat.: não avaliado (NE). AM e Alto Rio Negro. Obs.: cf. *Sorocea muriculata* W. Burger, fide Berg & Akkermans, *Proc. Kon. Ned., Akad. Wet.* 88(4): 381, 1985.
- S. guillemiana* Gaudichaud, *Bot. Voy. Bonite t.* 74, 1844. BAINHA-DE-ESPADA. T.: RJ, Rio de Janeiro, Corcovado; Guillemín 131, fem. (P). Cat.: vulnerável (VU) B2a, b. Nordeste e Sudeste.
- S. hilarii* Gaudichaud, *Bot. Voy. Bonite t.* 71, 1844. CANXIM-MIRIM. T.: RJ, Rio de Janeiro; Gaudichaud 1088, fem. (P). Cat.: em perigo (EN) B2a, b. Nordeste e Sudeste.
- S. hirtella* Mildbraed, *Notizbl. Bot. Gart. Berlin* 10: 183, 1927. SOROCO. T.: Peru, Alto Maranhão, Santiago, perto da foz do rio; Tessmann 4016, masc. (B). Cat.: não avaliado (NE). AC e AM.
- S. klotzschiana* Baillon, *Adansonia* 1: 212, t. 6, 1860. SOROCO. T.: AM, Rio Negro; Spruce 3794, fem. (P). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- S. macrogyna* Lanjow & W. Boer ex W. Burger, Lanjow & W. Boer, *Acta Bot. Neerl.* 11: 459, 1962. SOROCO. T.: AM, Humaitá, perto de Três Casas; Krukoff 6143, fem. (U). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.
- S. muriculata* Miquel, in Martius, *Fl. Bras.* 4(1): 113, 1853. SOROCO. T.: AM, perto de Eca; Martius (M). Cat.: não avaliado (NE). AC, AM e MT.
- S. opima* Macbride, *Field. Mus. Bot.* 11: 64, 1931. SACHA-CHIMICUA. T.: Peru, Loreto, Caballococha; Williams 2337, fem. (F). Cat.: não avaliado (NE). AM e RO. Obs.: cf. *Sorocea hirtella* Macbride, Berg & Akkermans, *Proc. Kon. Ned., Akad. Wet.* 88(4): 381, 1985.
- S. pileata* W. Burger ex W. Burger, Lanjow & W. Boer, *Acta Bot. Neerl.* 11: 442, 1962. SOROCO. T.: Bolívia, Ixiamas; R. S. Williams 412, fem. (NY). Cat.: não avaliado (NE). AC.
- S. racemosa* Gaudichaud, *Bot. Voy. Bonite t.* 72, 1844. CINCHO. T.: RJ, Rio de Janeiro; Gaudichaud 1090-bis, fem. (K). Cat.: em perigo (EN) B2a, b. Sudeste.
- S. saxicola* Hassler, *Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 7:* 11, 1907. T.: Paraguai, Concepcion; Hassler 7338, fem. (G). Cat.: não avaliado (NE). MT. Obs.: cf. *Sorocea sprucei* (Baillon) Macbride, fide Berg & Akkermans, *Proc. Kon. Ned., Akad. Wet.* 88(4): 381, 1985.
- S. sprucei* (Baillon) Macbride, *Field. Mus. Bot.* 11: 16, 1931. SOROCO. T.: Peru, perto de Tarapoto, San Martín; Spruce 4483, masc. (P). Cat.: não avaliado (NE). RR.
- S. steinbachii* C. C. Berg, *Proceedings (Botany)* c 88(4): 385, 1985. SOROCO. T.: Bolívia, Prov. Sara, Buena Vista, Santa Cruz; Steinbach 7356-bis, masc. (U, Isotipo: B, BM, F, GH, K, MO, NU e Z). Cat.: não avaliado (NE). Alto Amazonas.

***Trymatococcus* Poeppig et Endlicher**

- T. amazonicus* Poeppig & Endlicher, *Nov. Gen.* 2: 30, 6. 142, 1838. MURURÉ. T.: Peru, Mayñas, perto de Yurimaguas; Poeppig s/n (B). Cat.: não avaliado (NE). AM.
- T. paraensis* Ducke, *Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro* 3: 22, 1922. MURURÉ T.: PA, Gurupá; Ducke (RB, HAMP). Cat.: não avaliado (NE). PA.